

제 2 교시

2015학년도 대학수학능력시험 대비

강기원 모의고사 제 3회

수 학 영 역 [B형]

성명	
----	--

수험 번호					-				
-------	--	--	--	--	---	--	--	--	--

- 자신이 선택한 유형(A형/B형)의 문제인지 확인하십시오.
- 문제지의 해당란에 성명과 수험 번호를 정확히 쓰십시오.
- 답안지의 필적 확인란에 다음의 문구를 정자로 기재하십시오.

이 문제들은 쉽다고 자기최면을 걸어보자.

- 답안지의 해당란에 성명과 수험 번호를 쓰고, 또 수험 번호와 답을 정확히 표시하십시오.
- 단답형 답의 숫자에 '0'이 포함되면 그 '0'도 답란에 반드시 표시하십시오.
- 문항에 따라 배점이 다르니, 각 물음의 끝에 표시된 배점을 참고하십시오. 배점은 2점, 3점 또는 4점입니다.
- 계산은 문제지의 여백을 활용하십시오.

※ 시험이 시작되기 전까지 표지를 넘기지 마시오.

제 2 교시

수학 영역 [B형]

5 지선 다형

1. 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ a & 3 \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬 $A+2E$ 의 모든 성분의 합이

12일 때, a 의 값은? [2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

2. $\int_{-2}^2 (e^x - e^{-x}) dx$ 의 값을 구하면? [2점]


- ① $e^{-2} - e^2$ ② $e^2 - e^{-2}$ ③ 0
④ $e^2 + e^{-2}$ ⑤ $2e^2$

3. 평면 $2x + y + 2z + 7 = 0$ 과 점 $(1, 1, 1)$ 사이의 거리를 구하면?

[2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

4. 다음 그래프의 각 꼭짓점 사이의 연결 관계를 나타내는 행렬의 성분 중 0의 개수는? [3점]



- ① 29 ② 31 ③ 33
④ 35 ⑤ 37

5. $(x^2 - \frac{1}{x})^{10}$ 의 전개식에서 x^2 앞의 계수를 구하면? [3점]


- ① -252 ② -210 ③ 0
- ④ 210 ⑤ 252

6. 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 이 다음을 만족할 때, $b_6 \times b_{10}$ 의 값을 구하면? [3점]

(가) $a_{n+1} = 2a_n$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)
 (나) $a_8 = 8$
 (다) $a_{n+2} - a_n = b_n$

- ① 128 ② 256 ③ 512
- ④ 576 ⑤ 724

7. 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 아래 그림과 같이 x 축과 세 점 $(-1, 0)$, $(0, 0)$, $(1, 0)$ 에서 만나고 -1 과 1 을 각각 극대값과 극소값으로 가진다. 이 때, 무리방정식 $\sqrt{1 - \{f(x)\}^2} = x$ 의 실근의 개수를 구하시오. [3점]



- ① 1개 ② 2개 ③ 3개
- ④ 5개 ⑤ 7개


8. 어느 전구의 필라멘트의 저항은 온도에 따라 변하는데 이 전구를 켜 후 필라멘트의 온도와 저항을 각각 $T(T)$, $R(\Omega)$ 라 하면 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$\log R = 3\log 2 + k \log \frac{T}{300} \quad (\text{단, } k \text{는 상수이다.})$$

이 전구를 켜 후 필라멘트의 저항이 32Ω 일 때의 온도가 $1200T$ 이었고, 필라멘트의 저항이 128Ω 일 때의 온도가 aT 이었다. a 의 값은? [3점]


- ① 4800 ② 5200 ③ 5600
- ④ 6000 ⑤ 6400

9. 두 선분 AB, CD 가 평행하고 $\overline{AB}=4$, $\overline{CD}=6$ 인 등변사다리꼴 $ABCD$ 가 있다. $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{AD}=0$ 일 때, $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD}$ 의 값을 구하면? [3점]



- ① -36 ② -25 ③ -20
- ④ -16 ⑤ -10

10. 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같이 주어져 있다.



실수 전체의 집합에서 정의된 연속함수 $g(x)$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 다음 중 옳은 것만을 모두 고르면? [3점]

- ㄱ. $g(0) = 0$
- ㄴ. $g(0) = g(1) = g(3)$
- ㄷ. $y = g(x)$ 의 그래프는 직선이 될 수 없다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 두 이차정사각행렬 A, B 가 다음 조건을 만족한다.

$$ABA - A = 2E, BAB - B = 4E$$

다음 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [3점]

- ㄱ. $AB - E$ 의 역행렬이 존재한다.
- ㄴ. $B = 2A$
- ㄷ. $AB = BA$

- ① ㄱ
- ② ㄱ, ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 다음은 무한급수 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{k}(\sqrt{k} - \sqrt{k-1})$ 의 값을

구하는 과정이다.

$S_n = \sum_{k=1}^n \sqrt{k}(\sqrt{k} - \sqrt{k-1})$ 이라 하면

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{k} + \sqrt{k-1}}{2} (\sqrt{k} - \sqrt{k-1}) + \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{k} - \sqrt{k-1}}{2} (\sqrt{k} - \sqrt{k-1})$$

$$= \boxed{\text{가}} + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n (\sqrt{k} - \sqrt{k-1})^2$$

이 된다. 그런데 $k \geq 1$ 에 대하여 $\sqrt{k} - \sqrt{k-1} \leq 1$ 이므로

$$0 < \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n (\sqrt{k} - \sqrt{k-1})^2 \leq \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n (\sqrt{k} - \sqrt{k-1}) = \boxed{\text{나}}$$

이고 따라서 다음 부등식이 성립한다.

$$\boxed{\text{가}} < S_n \leq \boxed{\text{가}} + \boxed{\text{나}}$$

$$\frac{\boxed{\text{가}}}{n} < \frac{S_n}{n} \leq \frac{\boxed{\text{가}} + \boxed{\text{나}}}{n}$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\boxed{\text{가}}}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\boxed{\text{가}} + \boxed{\text{나}}}{n} = \boxed{\text{다}}$ 이므로

샌드위치의 정리에 의하여 다음이 성립한다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{k}(\sqrt{k} - \sqrt{k-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n} = \boxed{\text{다}}$$

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(n), g(n)$ 이라 하고 (다)에 알맞은 값을 p 라 할 때, $\log_2 f(p) + \log_2 g(p)$ 의 값을 구하면? [3점]

- ① -4
- ② $-\frac{7}{2}$
- ③ -3
- ④ $-\frac{5}{2}$
- ⑤ -2

[13~14] 두 실수 a, b 와 함수 $f(x) = a\cos x + b\sin x$ 에 대하여

13번과 14번의 두 물음에 답하시오.

13. 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 의 최댓값이 4일 때,

$|ab|$ 의 최댓값을 구하면? [3점]

- ① 1 ② 2 ③ 4
 ④ 8 ⑤ 16

14. 집합 M 이 다음과 같이 정의되어 있다.

$$M = \left\{ (a, b) \mid 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \text{에서 } f(x) \text{의 최댓값은 } 5 \text{이다.} \right\}$$

집합 M 의 원소를 좌표평면에 점찍어 그려지는 곡선을 C 라


하자. 곡선 C 와 직선 $x+y=0$ 이 이루는 도형의 넓이를

구하시오. [4점]

- ① $25 + \frac{25}{4}\pi$ ② $25 + \frac{25}{2}\pi$ ③ $50 - \frac{25}{4}\pi$
 ④ $50 - \frac{25}{2}\pi$ ⑤ $100 - 25\pi$

15. 자연수 n 에 대하여 직선 $y = \frac{n}{n+1}$ 과 함수 $y = \sin x$ 의 그래프가 제 1사분면에서 만나는 점의 x 좌표를 작은 수부터 크기순으로 나열할 때, n 번째 수를 a_n 이라 하자.


$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{2n-1} + a_{2n}}{n}$ 의 값은? [4점]



- ① 4π
- ② 2π
- ③ π
- ④ $\frac{\pi}{2}$
- ⑤ $\frac{\pi}{4}$

16. $\angle ACB = \frac{\pi}{2}$ 인 직각삼각형

ABC가 넓이를 50으로 유지하며 변 BC의 길이가 감소하고 있다. 변 BC의 시간에 대한 길이의 변화율과 변 AC의 시간에 대한 길이의 변화율의 합이 0인 시점에서의 변 AB의 시간에 대한 길이의 변화율을 구하면? [4점]



- ① 10
- ② 5
- ③ -5
- ④ -10
- ⑤ 0

17. 어느 도시에 있는 모든 고등학교

3학년 학생들을 대상으로 수학시험을 본 결과, 남학생들의 점수는 평균이 60점, 표준편차가 10점인 정규분포를 따르고, 여학생들의 점수는 평균이 65점, 표준편차가 15점인 정규분포를 따른다고

<표준정규분포표>

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.19
1	0.34
1.5	0.43
2	0.48
2.5	0.49

한다. 이 시험을 본 학생들 중 임의로 택한 한 학생의 점수가 80점 이상일 때, 이 학생이 여학생일 확률이 96%라고 할 때, 이 도시에 있는 고등학교 3학년 학생들의 남녀 성비를 구하면?

[4점]

- ① 4:5 ② 3:4 ③ 3:5
- ④ 2:3 ⑤ 1:3

18. 각 면에 1부터 6까지의 자연수가 적힌 정육면체가 1이 적힌 면이 바닥을 보며 놓여있다. 바닥에 붙어있는 정육면체의 네 변 중 하나를 골라 정육면체를 굴리는 시행을 n 번 했을 때, 1이 적힌 면이 바닥을 보고 있을 확률을 p_n 이라 하자. 무한급수

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| p_n - \frac{1}{6} \right| \text{의 값을 구하면? [4점]}$$

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{3}$
- ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

19. 일차변환 f 에 대한 다음의 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? [4점]


- ㄱ. 서로 다른 두 점 A, B 와 원점 O 에 대하여 $f(A)=O, f(B)=O$ 를 만족하는 f 를 나타내는 행렬은 영행렬이다.
- ㄴ. 원점을 지나지 않는 직선 l 에 대하여 l 위의 모든 점이 f 에 의하여 원점으로 이동하면 f 를 나타내는 행렬은 영행렬이다.
- ㄷ. 좌표평면에 놓인 삼각형 ABC 에 대하여 세 점 $f(A), f(B), f(C)$ 가 삼각형을 이루면 f 를 나타내는 행렬은 역행렬을 가진다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄴ, ㄷ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 한 변의 길이가 6인 정육각형 $A_1B_1C_1D_1E_1F_1$ 의 각 변 $A_1B_1, B_1C_1, C_1D_1, D_1E_1, E_1F_1, F_1A_1$ 의 중점을 각각 $P_1, Q_1, R_1, S_1, T_1, U_1$ 이라 하고 세 선분 P_1S_1, Q_1T_1, R_1U_1 이 만나는 점을 O 라 하자. 정육각형 내부에 세 선분 P_1S_1, Q_1T_1, R_1U_1 에 의해 분할되는 6개의 사각형에 각각 내접하는 원을 그리고 이 6개의 원이 $OP_1, OQ_1, OR_1, OS_1, OT_1, OU_1$ 와 만나는 점을 각각 $A_2, B_2, C_2, D_2, E_2, F_2$ 라 하자. 정육각형 $A_2B_2C_2D_2E_2F_2$ 을 그리고 이 정육각형의 내부에 그려지는 모든 곡선과 직선을 지운 후 남은 도형을 K_1 이라 하자.

각 변 $A_2B_2, B_2C_2, C_2D_2, D_2E_2, E_2F_2, F_2A_2$ 의 중점을 각각 $P_2, Q_2, R_2, S_2, T_2, U_2$ 라 하고 세 선분 P_2S_2, Q_2T_2, R_2U_2 가 만나는 점을 O 라 하자. 정육각형 내부에 세 선분 P_2S_2, Q_2T_2, R_2U_2 에 의해 분할되는 6개의 사각형에 각각 내접하는 원을 그리고 이 6개의 원이 $OP_2, OQ_2, OR_2, OS_2, OT_2, OU_2$ 와 만나는 점을 각각 $A_3, B_3, C_3, D_3, E_3, F_3$ 라 하자. 정육각형 $A_3B_3C_3D_3E_3F_3$ 을 그리고 이 정육각형의 내부에 그려지는 모든 곡선과 직선을 지운 후 남은 도형을 K_2 라 하자.

이와 같은 방법으로 도형 K_n 을 만들어 갈 때, K_n 에 그려진 원호 부분의 길이의 합을 l_n 이라 하자. $\lim_{n \rightarrow \infty} l_n$ 의 값을 구하시오. [4점]



- ① $\frac{48\pi(6 + \sqrt{3})}{11}$ ② $\frac{24\pi(6 + \sqrt{3})}{11}$
 ③ $\frac{48\pi(3 + \sqrt{6})}{11}$ ④ $\frac{48\pi(6 + \sqrt{3})}{17}$
 ⑤ $\frac{24\pi(6 + \sqrt{3})}{17}$

21. 실수전체의 집합에서 미분 가능한 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족한다.

- (가) 임의의 실수 x 에 대하여 $f(x)+f(10-x)$ 는 상수이다.
- (나) 임의의 실수 x 에 대하여 $f'(x)=f'(x+10)$
- (다) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{10n}^{10n+10} \{f(x)-x\} dx = 30$


$\int_0^{10} xf'(x) dx$ 의 값은? [4점]

- ① 30
- ② 40
- ③ 50
- ④ 60
- ⑤ 70

단답형

22. $\lim_{n \rightarrow \infty} 2n \sin \frac{10}{n}$ 의 값을 구하면? [3점]

23. $0 \leq x \leq 9$ 에서 정의된 연속확률변수 X 의 확률밀도함수 $f(x)$ 의 그래프가 아래 그림과 같이 주어졌을 때, $E(X)$ 의 값을 구하면? [3점]



24. $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 으로 표현되는 일차변환을 f 라 하자. f 에 의하여

쌍곡선 $\frac{x^2}{49} - \frac{y^2}{15} = 1$ 이 옮겨지는 쌍곡선을 C 라 하면 쌍곡선

C 가 타원 $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 과 두 초점을 공유한다. 이 때, b^2 의

값을 구하면? [3점]


25. 각 자리 수의 합이 7인 n 자리의 자연수의 개수를 a_n 이라 할

때, $\sum_{k=1}^6 a_k$ 의 값은? [3점]


26. $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변 삼각형 $\triangle ABC$ 가 있다. 아래 그림과 같이 각도 $\angle ABC$ 를 2:1로 내분하는 반직선 l 이 선분 AC 와 교점을 가질 때, 반직선 l 위의 점 P 가 $\overline{BC} = \overline{PC}$ 를 만족한다.

$\angle APB = 3\angle PBC$ 일 때, $\angle PBC = \frac{q}{p}\pi$ 를 만족하는 서로소인 두


자연수 p, q 에 대하여 $p^2 + q^2$ 의 값을 구하시오. [4점]



27. 한 변의 길이가 12인 정삼각형 ABC가 있다. AB의 3등분점 중에서 A에 가까운 점을 D라 하고 AC의 3등분점 중에서 A에 가까운 점을 E라 하자. 세 선분 BD, CE, BC를 지름으로 가지는 반원을 각각 삼각형 ABC의 외부에 그리고 C_1, C_2, C_3 라 하자. C_1 위의 점 Q, C_2 위의 점 R, C_3 위의 점 P에 대하여 $|\overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{PR}|$ 의 최댓값이 $x + y\sqrt{3}$ 이라고 할 때, $x + y$ 의 값을 구하시오. (단, x, y 는 유리수이다.) [4점]



28. 두 정점 $F(-5, 0), F'(5, 0)$ 와 쌍곡선 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 의 제 1사분면 부분에 속한 동점 P에 대하여 두 선분 PF, FF'를 지름으로 하는 두 원의 교점 중 F가 아닌 점을 Q라 하자. 이때, \overline{FQ} 의 최댓값을 구하시오. [4점]




29. 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 $g(x) = f(x) - [f(x)]$ 라 할 때, 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$ 가 수렴한다.
- (나) $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) \neq g(1)$
- (다) $\lim_{x \rightarrow 3} g(x) = 0$

$\frac{f'(11)}{f'(5)}$ 의 값을 구하시오.(단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수이다.) [4점]

30. 점 O 를 중심으로 가지는 구와 점 O 를 지나는 평면 α 가 있다. 구와 α 가 만나서 이루는 원에 내접하는 정삼각형 ABC 에 대하여 선분 AB 를 포함하는 평면 β 가 구와 만나서 이루는 원을 C_1 이라 하자. 선분 BC 를 포함하는 평면 γ 가 원 C_1 의 중심을 지날 때, α 와 γ 가 이루는 예각의 최대값 θ_{\max} 에 대하여 $\cos^2 \theta_{\max} = \frac{q}{p}$ 가 성립한다. 서로소인 두 자연수 p, q 에 대하여 $p+q$ 의 값을 구하시오. [4점]



※ 시험이 시작되기 전까지 표지를 넘기지 마시오.