0216월 지구······
0219월 지구······
021수능 지구······ 9
0226월 지구······
0229월 지구······
022수능 지구
0236월 지구······
0239월 지구······
023수능 지구


2021학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가 문제지

제 4 교시

과학탐구 영역(지구과학 I)

수험 번호 성명 제[]선택


1. 다음은 어느 지층의 퇴적 구조에 대한 학생 A, B, C의 대화를 나타낸 것이다.



제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은?

- ① A

- ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C
- 2. 그림 (가), (나), (다)는 습곡, 포획, 절리를 순서 없이 나타낸 것이다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

―<보 기>-

- ㄱ. (가)는 (나)보다 깊은 곳에서 형성되었다.
- ㄴ. (나)는 수축에 의해 형성되었다.
- 다. (다)에서 A는 B보다 먼저 생성되었다.
- ① ¬

- 3. 그림은 별의 분광형에 따른 흡수선의 상대적 세기를 나타낸 것이다.
 - 이 자료에 대한 설명으로 (상댓값) 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



------<보 기>-----

- ㄱ. 흰색 별에서 H I 흡수선이 CaⅡ 흡수선보다 강하게 나타난다.
- L. 주계열에서 B0형보다 표면 온도가 높은 별일수록 HI 흡수선의 세기가 강해진다.
- 다. 태양과 광도가 같고 반지름이 작은 별의 CaⅡ 흡수선은 G2형 별보다 강하게 나타난다.
- ① ¬
 - 2) L


- 37, 54, 57, 6, 5

4. 다음은 해수의 염분에 영향을 미치는 요인을 알아보기 위한 실험이다.

[실험 과정]

- (가) 염분이 34.5psu인 소금물 900mL를 만들고, 3개의 비커에 각각 300 mL씩 나눠 담는다.
- (나) 각 비커의 소금물에 다음과 같이 각각 다른 과정을 수행한다.

과정	실험 방법	
A	증류수 100 mL를 넣어 섞는다.	
В	10 분간 가열하여 증발시킨다.	
С	표층이 얼음으로 덮일 정도까지 천천히 얼린다.	





(다) 각 비커에 있는 소금물의 염분을 측정하여 기록한다.

[실험 결과]

과정	A	В	С
염분(psu)	\bigcirc	Ĺ.	Œ

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

----<보 기>--


- □. 담수의 유입에 의한 염분 변화를 알아보기 위한 과정은 A에 해당한다.
- ㄴ. 실험 결과에서 34.5보다 큰 값은 ◐과 ⓒ이다.
- ㄷ. 남극 저층수가 형성되는 과정은 C에 해당한다.
- ① ¬


- 2 L 3 7, L 4 L, L 5 7, L, L

지구과

학

5. 그림 (가)와 (나)는 서로 다른 계절에 관측된 우리나라 주변 표층 해류의 평균 속력과 이동 방향을 나타낸 것이다.






이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로


-----<보 기>---

- ¬. (가)와 (나)의 평균 속력 차는 해역 A보다 B에서 크다.
- ㄴ. 동한 난류의 평균 속력은 (나)보다 (가)가 빠르다.
- 다. 해역 C에 흐르는 해류는 북태평양 아열대 순환의 일부이다.

과학탐구 영역

6. 그림 (가)는 지하 온도 분포와 암석의 용융 곡선 ⋽, □, □을, (나)는 마그마가 분출되는 지역 A와 B를 나타낸 것이다.






이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

-----<보 기>-----

- ㄱ. (가)에서 물이 포함된 암석의 용융 곡선은 □과 ▷이다.
- L. B에서는 주로 현무암질 마그마가 분출된다.
- \Box . A에서 분출되는 마그마는 주로 $c \rightarrow c'$ 과정에 의해 생성된다.
- \bigcirc
- (2) L
- ③ ⊏
- 47, 5 5 4, 5
- 7. 그림은 대서양의 해저면에서 판의 경계를 가로지르는 $P_1 P_6$ 구간을, 표는 각 지점의 연직 방향에 있는 해수면상에서 음파를 발사하여 해저면에 반사되어 되돌아오는 데 걸리는 시간을 나타낸 것이다.



지점	P_1 로부터의 거리 (km)	시간(초)
P_1	0	7.70
P_2	420	7.36
P_3	840	6.14
P_4	1260	3.95
P_5	1680	6.55
P_6	2100	6.97

이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 해수에서 음파의 속도는 일정하다.)

-----<보 기>-

- ㄱ. 수심은 P₆이 P₄보다 깊다.
- ∟. P₃ − P₅ 구간에는 발산형 경계가 있다.
- 다. 해양 지각의 나이는 P₄가 P₂보다 많다.
- ① ¬

- 2 = 3 7, = 4 =, = 5 7, =, =
- 8. 그림은 어느 외계 행성과 중심별이 공통 질량 중심을 중심으로 공전하는 모습을 나타낸 것이다. 행성은 원 궤도를 따라 공전하며, 공전 궤도면은 공통 질량 중심 관측자의 시선 방향과 나란하다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 식 현상을 이용하여 행성의 존재를 확인할 수 있다.
- L. 행성이 A를 지날 때 중심별의 청색 편이가 나타난다.
- C. 중심별의 어느 흡수선의 파장 변화 크기는 행성이 A를 지날 때가 A'를 지날 때의 2배이다.

9. 그림 (가), (나), (다)는 각각 세이퍼트은하, 퀘이사, 전파 은하의 영상을 나타낸 것이다. (가)와 (나)는 가시광선 영상이고, (다)는 가시광선과 전파로 관측하여 합성한 영상이다.









이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

----<보 기>---

- ㄱ. (가)와 (다)의 은하 중심부 별들의 회전축은 관측자의 시선 방향과 일치한다.
- L. 각 은하의 <u>중심부의 밝기</u>는 (나)의 은하가 가장 크다.
- ㄷ. (다)의 제트는 은하의 중심에서 방출되는 별들의 흐름이다.
- ① ¬ ② L
- ③ ⊏
- ④ ¬, ∟ ⑤ ∟, ⊏

10. 그림 (가)는 대서양의 해수 순환의 모식도를, (나)는 ⊙과 ⓒ에서 형성되는 각각의 수괴를 수온 - 염분도에 A와 B로 순서 없이 나타낸 것이다.






(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

- ㄱ. ○에서 형성되는 수괴는 A에 해당한다.
- L. A와 B는 심층 해수에 산소를 공급한다.
- ㄷ. 심층 순환은 표층 순환보다 느리다.

11. 그림 (가)는 지구의 플룸 구조 모식도이고, (나)는 판의 경계와 열점의 분포를 나타낸 것이다. (가)의 ⑦~②은 플룸이 상승하거나 하강하는 곳이고, 이들의 대략적 위치는 각각 (나)의 A~D 중 하나이다.






이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

---<보 기>-

- □. A는 □에 해당한다.
- ㄴ. 열점은 판과 같은 방향과 속력으로 움직인다.
- ㄷ. 대규모의 뜨거운 플룸은 맨틀과 외핵의 경계부에서 생성된다.
- ① ¬
- ② ⊏

- 37, 4 4 4, 5 7, 4, 5
- 12. 표는 질량이 서로 다른 별 A~D의 물리적 성질을, 그림은 별 A와 D를 H-R도에 나타낸 것이다. L_{\odot} 는 태양 광도이다.

별	표면 온도 (K)	광도 (L _⊙)
A	()	()
В	3500	100000
С	20000	10000
D	()	()




이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

-<보 기>

- □. A와 B는 적색 거성이다.
- ㄴ. 반지름은 B > C > D이다.
- ㄷ. C의 나이는 태양보다 적다.
- ① ¬

- 2 = 3 7, 4 -, = 5 7, -, =
- 13. 그림은 지구 자전축 경사각의 변화를 나타낸 것이다.


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 지구 자전축 경사각 이외의 요인은 변하지 않는다.)




----<보 기>--

- ㄱ. 30°S에서 기온의 연교차는 현재가 □시기보다 작다.
- ∟. 30°N에서 겨울철 태양의 남중 고도는 현재가 ⑦시기보다 높다.
- ㄷ. 1년 동안 지구에 입사하는 평균 태양 복사 에너지양은 □ 시기가 □ 시기보다 많다.
- ① 7 ② L
- 3 = 4 7, = 5 7, =

14. 그림 (가)는 어느 지역의 지질 단면을, (나)는 방사성 원소 X 에 의해 생성된 자원소 Y의 함량을 시간에 따라 나타낸 것이다. 화성암 A, B, C에는 X와 Y가 포함되어 있으며, Y는 모두 X의 붕괴 결과 생성되었다. 현재 C에 있는 X와 Y의 함량은 같다.






이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

----<보 기>-

- ¬. D는 화폐석이 번성하던 시대에 생성되었다.
- └. Y의 함량
 ※ A가 B보다 크다.
- \Box . 암석의 생성 순서는 $D \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow B \rightarrow F$ 이다.

- 15. 그림 (가)와 (나)는 어느 온대 저기압이 우리나라를 지날 때 12시간 간격으로 작성한 지상 일기도를 순서대로 나타낸 것이다. 일기 기호는 A 지점에서 관측한 기상 요소를 표시한 것이다.




이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로

----<보 기>---

- ㄱ. A 지점의 풍향은 시계 방향으로 바뀌었다.
- ㄴ. 한랭 전선이 통과한 후에 A에서의 기온은 9°C 하강하였다.
- ㄷ. 온난 전선면과 한랭 전선면은 각각 전선으로부터 지표상의 공기가 더 차가운 쪽에 위치한다.

과학탐구 영역


16. 그림 (가)는 현재 우주를 구성하는 요소 A, B, C의 상대적 비율을 나타낸 것이고, (나)는 빅뱅 이후 현재까지 우주의 팽창 속도를 추정하여 나타낸 것이다. A, B, C는 각각 보통 물질, 암흑 물질, 암흑 에너지 중 하나이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

---<보 기>--

- □. 우주가 팽창하는 동안 C가 차지하는 비율은 증가한다.
- ㄴ. ⑤시기에 우주는 팽창하지 않았다.
- □. 우주 팽창에 미치는 B의 영향은 □ 시기가 ¬시기보다 크다.
- \bigcirc
- (2) L
- ③ ⊏
- 4) 7, 6 5 7, 6
- 17. 그림 (가)는 우주론 A에 의한 우주의 크기를, (나)는 우주론 B에 의한 우주의 온도를 나타낸 것이다. A와 B는 우주 팽창을 설명한다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

---<보 기>-

- ㄱ. 우주 배경 복사가 우주의 양쪽 반대편 지평선에서 거의 같게 관측되는 것은 (가)의 ①시기에 일어난 팽창으로 설명된다.
- L. A는 수소와 헬륨의 질량비가 거의 3:1로 관측되는 결과와 부합된다.
- 다. 우주의 밀도 변화는 B가 A보다 크다.
- ① ¬
- ② ⊏

- (3) 7, L (4) L, L (5) 7, L, L
- 18. 그림은 북반구 해상에서 관측한 태풍의 하층(고도 2km 수평면) 풍속 분포를 나타낸 것이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 (km) 있는 대로 고른 것은? (단, 등압선은 태풍의 이동




방향 축에 대해 대칭이라고 가정한다.) [3점]

------<보 기>--

- ㄱ. 태풍은 북동 방향으로 이동하고 있다.
- ㄴ. 태풍 중심 부근의 해역에서 수온 약층의 차가운 물이 용승한다.
- ㄷ. 태풍의 상층 공기는 반시계 방향으로 불어 나간다.
- ① ¬ ② L
- ③ ⊏
- 47, 6 5 4, 5

19. 그림 (가)와 (나)는 주계열에 속한 별 A와 B에서 우세하게 일어나는 핵융합 반응을 각각 나타낸 것이다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

----<보 기>-

- ¬. 별의 내부 온도는 A가 B보다 높다.
- L. (가)에서 ¹²C는 촉매이다.
- ㄷ. (가)와 (나)에 의해 별의 질량은 감소한다.
- ① ¬

- **20.** 그림 (가)는 어느 해(Y)에 시작된 엘니뇨 또는 라니냐 시기 동안 태평양 적도 부근에서 기상위성으로 관측한 적외선 방출 복사 에너지의 편차(관측값 - 평년값)를, (나)는 서태평양과 동태평양에 위치한 각 지점의 해면 기압 편차(관측값 - 평년값)를 나타낸 것이다. (가)의 시기는 (나)의 ①에 해당한다.



이 자료에 근거해서 평년과 비교할 때, (가) 시기에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

-----<보 기>--

- □. 동태평양에서 두꺼운 적운형 구름의 발생이 줄어든다.
- ㄴ. 워커 순환이 약화된다.
- ㄷ. (나)의 A는 서태평양에 해당한다.
- \bigcirc

- * 확인 사항
- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인 하시오.

제 4 교시

과학탐구 영역(지구과학 I)

수험 번호 성명

1. 표는 퇴적물의 기원에 따른 퇴적암의 종류를 나타낸 것이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

구분	퇴적물	퇴적암
Λ	식물	석탄
А	규조	처트
D	모래	Ī
В	(L)	역암


- □. A는 쇄설성 퇴적암이다.
- ㄴ. ⑦은 암염이다.
- □. 자갈은 □에 해당한다.

① ¬

(2) L

3 = 4 = , = 5 = , =

2. 그림은 현생 누대 동안 동물 과의 수를 현재 동물 과의 수에 대한 비로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

---<보 기>-


- □. A 시기에 육상 동물이 출현하였다.
- L. 동물 과의 멸종 비율은 B시기가 C시기보다 크다.
- ㄷ. D 시기에 공룡이 멸종하였다.

① ¬

② L

3 = 4 7, = 5 7, =

3. 그림은 분광형과 광도를 기준으로 한 H-R도이고, 표의 (기), (나), (다)는 각각 H-R도에 분류된 별의 집단 ⑦, □, □의 특징 중 하나이다.




구분	특징		
(プト)	별이 일생의 대부분을 보내는 단계로 정역학 평형 상태에 놓여 별의 크기기 거의 일정하게 유지된다.		
(나)	주계열을 벗어난 단계로, 핵융합 반응을 통해 무거운 원소들이 만들어진다.		
태양과 질량이 비슷한 별의 최종 (다) 단계로, 별의 바깥층 물질이 ⁵ 바추되 후 주시해마 나는다			


(가), (나), (다)에 해당하는 별의 집단으로 옳은 것은?

	(フト)	(나)	(다)
1	$\overline{\bigcirc}$	<u> </u>	
2	Ū		Ē
3	<u>L</u>		\bigcirc
4	╚		
(E)		1	\bigcirc

4. 그림 (가)는 어느 날 21 시 우리나라 주변의 지상 일기도를, (나)는 (가)의 21 시부터 14 시간 동안 관측소 A와 B 중 한 곳에서 관측한 기온과 기압을 나타낸 것이다.

제[]선택





이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]


- □. (가)에서 A의 상층부에는 주로 층운형 구름이 발달한다.
- L. (나)는 B의 관측 자료이다.
- □. (나)의 관측소에서 つ기간 동안 풍향은 시계 반대 방향으로 바뀌었다.


① ¬

2 L 3 7, L 4 L, L 5 7, L, L

지 구 과

5. 그림 (가)는 우리나라 주변 해역 A, B, C를, (나)는 세 해역 표층 해수의 수온과 염분을 수온 - 염분도에 나타낸 것이다. B와 C의 수온과 염분 분포는 각각 ①과 ① 중 하나이다.






이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ¬. ○은 B에 해당한다.
- L. 해수의 밀도는 A가 C보다 크다.
- □. B와 C의 해수 밀도 차이는 수온보다 염분의 영향이 더 크다.

과학탐구 영역

6. 그림은 방사성 동위 원소 A와 B의 붕괴 곡선을 나타낸 것이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



-<보 기>-


- □. 반감기는 A가 B의 14배이다.
- L. 7억 년 전 생성된 화성암에 포함된 A는 두 번의 반갂기를 거쳤다.
- \Box . 암석에 포함된 $\frac{B의 \ \circ}{B의 \ N원소 \ \circ}$ 이 $\frac{1}{4}$ 로 되는 데 걸리는 시간은 1억 년이다.


 \bigcirc

2 L

37, 5 4 4, 5 7, 4, 5

7. 그림은 태평양 적도 부근 해역에서의 대기 순환 모습을 나타낸 것이다. (가)와 (나)는 각각 엘니뇨와 라니냐 시기 중 하나이다.





이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

----<보 기>--


- □. 서태평양 적도 부근 무역풍의 세기는 (가)가 (나)보다 강하다.
- ㄴ. 동태평양 적도 부근 해역의 용승은 (가)가 (나)보다 강하다.
- □. (B 지점 해면 기압 A 지점 해면 기압)의 값은 (가)가 (나)보다 크다.

 \bigcirc

② ⊏

37, 4 4 4, 5 7, 4, 5

8. 그림은 해양 지각의 연령 분포를 나타낸 것이다.




A~D 지점에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

-----<보 기>---

- ㄱ. 해저 퇴적물의 두께는 A가 B보다 두껍다.
- L. 최근 4천만 년 동안 평균 이동 속력은 B가 속한 판이 C가 속한 판보다 크다.
- 다. 지진 활동은 C가 D보다 활발하다.

9. 그림은 해양판이 섭입하면서 마그마가 생성되는 어느 해구 지역의 지진파 단층 촬영 영상을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

---<보 기>-


- ㄱ. ⑦은 열점이다.
- L. A 지점에서는 주로 SiO₅의 함량이 52%보다 낮은 마그마가 생성된다.
- C. B 지점은 맨틀 대류의 하강부이다.

 \bigcirc

② L

37, 5 4 4, 5 5 7, 6, 5

10. 그림은 어느 해 태평양에서 유실된 컨테이너에 실려 있던 운동화가 발견된 지점과 표층 해류 A와 B의 일부를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

-----<보 기>-


- ¬. A는 편서풍의 영향을 받는다.
- L. B는 아열대 순환의 일부이다.
- ㄷ. 북아메리카 해안에서 발견된 운동화는 북태평양 해류의 영향을 받았다.


 \bigcirc

② L

37, 5 4 4, 5 57, 4, 5

11. 그림 (가)의 A와 B는 분광형이 G2인 주계열성의 중심으로부터 표면까지 거리에 따른 수소 함량 비율과 온도를 순서 없이 나타낸 것이고. ○라 ○은 에너지 전달 방식이 다른 구간을 표시한 것이다. (나)는 별의 중심 온도에 따른 p-p 반응과 CNO 순환 반응의 상대적 에너지 생산량을 비교한 것이다.






이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ¬. A는 온도이다.
- L. (가)의 핵에서는 CNO 순환 반응보다 p-p 반응에 의해 생성되는 에너지의 양이 많다.
- □. 대류층에 해당하는 것은 □이다.

12. 다음은 세 학생이 다양한 외부 은하를 형태에 따라 분류하는 탐구 활동의 일부를 나타낸 것이다.


(탐구 과정)
(가) 다양한 형태의 은하 사진을 준비한다.
(나) '규칙적인 구조가 있는가?'에 따라 은하를 분류한다.
(다) (나)의 조건을 만족하는 은하를 '() 이/가 있는가?'에 따라 A와 B 그룹으로 분류한다.
(라) A와 B 그룹에 적용할 추가 분류 기준을 만든다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

-<보 기>-

- ㄱ. 나선팔은 ⊙에 해당한다.
- ㄴ. 허블의 분류 체계에 따르면 ①은 불규칙 은하이다.
- □. '구에 가까운 정도'는 ⓒ에 해당한다.
- 13. 그림 (가)는 어느 외계 행성계에서 식 현상을 일으키는 행성 A, B, C에 의한 시간에 따른 중심별의 겉보기 밝기 변화를, (나)는 A, B, C 중 두 행성에 의한 중심별의 겉보기 밝기 변화를 나타낸 것이다. 세 행성의 공전 궤도면은 관측자의 시선 방향과 나란하다.




이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

-----<보 기>---

- □. 행성의 반지름은 B가 A의 3배이다.
- L. 행성의 공전 주기는 C가 가장 길다.
- 다. 행성이 중심별을 통과하는 데 걸리는 시간은 C가 B보다 길다.


14. 그림은 기후 변화 요인 ¬과 □을 고려하여 추정한 지구 평균 기온 편차(추정값 - 기준값)와 관측 기온 편차(관측값 - 기준값)를 나타낸 것이다. ¬과 □은 각각 온실 기체와 자연적 요인 중 하나이고, 기준값은 1880년~1919년의 평균 기온이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

-<보 기>-

- □. 지구 해수면의 평균 높이는 B 시기가 A 시기보다 높다.
- □. 대기권에 도달하는 태양 복사 에너지양의 변화는 □에 해당한다.
- 다. B 시기의 관측 기온 변화 추세는 자연적 요인보다 온실 기체에 의한 영향이 더 크다.
- 15. 그림은 별의 스펙트럼에 나타난 흡수선의 상대적 세기를 온도에 따라 나타낸 것이고, 표는 별 A, B, C의 물리량과 특징을 나타낸 것이다.



별	표면 온도(K)	절대 등급	특징
Α	()	11.0	별의 색깔은 흰색이다.
В	3500	()	반지름이 C의 100배이다.
С	6000	6.0	()


이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 반지름은 A가 C보다 크다.
- ② B의 절대 등급은 -4.0보다 크다.
- ③ 세 별 중 Fe I 흡수선은 A에서 가장 강하다.
- ④ 단위 시간 당 방출하는 복사 에너지양은 C가 B보다 많다.
- ⑤ C에서는 FeⅡ 흡수선이 CaⅡ 흡수선보다 강하게 나타난다.

과학탐구 영역

16. 그림은 대서양 심층 순환의 일부를 모식적으로 나타낸 것이다. 수괴 A, B, C는 각각 북대서양 심층수, 남극 저층수, 남극 중층수 중 하나이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?





- □. 침강하는 해수의 밀도는 A가 C보다 작다.
- L. B는 형성된 곳에서 ¬지점까지 도달하는 데 걸리는 시간이 1년보다 짧다.
- C. C는 표층 해수에서 (증발량 강수량) 값의 감소에 의한 밀도 변화로 형성된다.

① ¬ (2) L

37. 57. 40 4. 57. 4. 5

17. 그림 (가)는 표준 우주 모형에서 시간에 따른 우주의 크기 변화를, (나)는 플랑크 망원경의 우주 배경 복사 관측 결과로부터 추론한 현재 우주를 구성하는 요소의 비율을 나타낸 것이다.





이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?


----<보 기>-

- ㄱ. 우주 배경 복사는 □시기에 방출된 빛이다.
- L. 현재 우주를 가속 팽창시키는 역할을 하는 것은 A이다.
- 다. B에서 가장 큰 비율을 차지하는 것은 중성자이다.

① ¬

- ② L
- ③ ⊏
- 47, 57, 5

18. 그림은 여러 외부 은하를 관측해서 구한 은하 $A \sim I$ 의 성간 기체에 존재하는 원소의 질량비를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

-----<보 기>--


- ㄱ. ○은 수소 핵융합으로부터 만들어지는 원소이다.
- L. 성간 기체에 포함된 수소의 총 질량 은 A가 B보다 크다.
- ㄷ. 이 관측 결과는 우주의 밀도가 시간과 관계없이 일정하다고 보는 우주론의 증거가 된다.

 \bigcirc

② ⊏

37, 4 4 4, 5 7, 4, 5

19. 그림 (가)는 어느 날 05시 우리나라 주변의 적외 영상을, (나)는 다음 날 09시 지상 일기도를 나타낸 것이다.



이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

----<보 기>---


- □. (가)의 A 해역에서 표층 해수의 침강이 나타난다.
- ㄴ. (가)에서 구름 최상부의 고도는 B가 C보다 높다.
- 다. (나)에서 풍속은 E가 D보다 크다.

① ¬

② ⊏

37, 4 4 4, 5 7, 4, 5

20. 그림은 유럽과 북아메리카 대륙에서 측정한 5억 년 전부터 ©시기까지 고지자기극의 겉보기 이동 경로를 겹쳤을 때의 대륙 모습을 나타낸 것이다. 고지자기극은 고지자기 방향으로부터 추정한 지리상 북극이고, 실제 진북은 변하지 않았다.



이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

-<보 기>-

- □. 5억 년 전에 지자기 북극은 적도 부근에 위치하였다.
- ㄴ. 북아메리카에서 측정한 고지자기 복각은 ○시기가 귀시기보다 크다.
- □. 유럽은 □시기부터 □시기까지 저위도 방향으로 이동하였다.

 \bigcirc

- ② L
- 37, 54, 57, 6, 5

* 확인 사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인 하시오.

2021학년도 대학수학능력시험 문제지

제 4 교시

과학탐구 영역(지구과학I)

수험 번호 제[]선택 성명


1. 다음은 판 구조론이 정립되는 과정에서 등장한 두 이론에 대하여 학생 A, B, C가 나눈 대화를 나타낸 것이다.


Γ	이론	내용	
	Э	고생대 말에 판게아가 존재하였고, 약 2 억 년 전에 분리되기 시작하여 현재와 같은 대륙 분포가 되었다.	
	(L)	맨틀이 대류하는 과정에서 대륙이 이동할 수 있다.	



제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은?

- ① A (2) B
- ③ A. C
- ④ B, C
- ⑤ A, B, C
- 2. 그림 (가)는 태평양의 해역 A, B, C를, (나)는 이 세 해역에서 관측한 수온과 염분을 수온 - 염분도에 ①, ①, ⑤으로 순서 없이 나타낸 것이다.






이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

---<보 기>-

- ¬. A의 관측값은 □이다.
- L. A, B, C 중 해수의 밀도가 가장 큰 해역은 B이다.
- 다. C에 흐르는 해류는 무역풍에 의해 형성된다.
- ① ¬ ② □

- 37, 4 4 4, 5 7, 4, 5
- 3. 그림은 북반구 중위도 어느 해역에서 1년 동안 관측한 수온 변화를 등수온선으로 나타낸 깊 30 것이다.





이 자료에 대한 설명으로 옳은 90년

것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 표층에서 수온의 연교차는 10℃보다 크다.
- ㄴ. 수온 약층은 9월이 5월보다 뚜렷하게 나타난다.
- ㄷ. 6℃ 등수온선은 5월이 11월보다 깊은 곳에서 나타난다.

4. 그림 (가)는 마그마가 생성되는 지역 A~D를, (나)는 마그마가 생성되는 과정 중 하나를 나타낸 것이다.





이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

-<보 기>-

- □. A의 하부에는 플룸 상승류가 있다.
- ㄴ. (나)의 ⑦ 과정에 의해 마그마가 생성되는 지역은 B이다.
- ㄷ. 생성되는 마그마의 SiO₂ 함량(%)은 C에서가 D에서보다
- \bigcirc
- (2) L
- 37, 5 4 4, 5 5 7, 6, 5

지구과

학


5. 그림은 40억 년 전부터 현재까지의 지질 시대를 3개의 누대로 나타낸 것이다.





이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

―<보 기>-

- ¬. 대기 중 산소의 농도는 A 시기가 B 시기보다 높았다.
- L. 다세포 동물은 B 시기에 출현했다.
- 다. 가장 큰 규모의 대멸종은 C 시기에 발생했다.
- \bigcirc
 - ② □
- 37, 4 4 4, 5 7, 4, 5
- 6. 그림 (7)는 해수면이 하강하는 과정에서 형성된 퇴적층의 단면 이고, (나)는 (가)의 퇴적층에서 나타나는 퇴적 구조 A와 B이다.







이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

----<보 기>---

- ㄱ. (가)의 퇴적층 중 가장 얕은 수심에서 형성된 것은 이암층이다.
- L. (나)의 A와 B는 주로 역암층에서 관찰된다.
- 다. (나)의 A와 B 중 층리면에서 관찰되는 퇴적 구조는 B이다.
- ① ¬

- 2 L 3 L 4 7, L 5 L, L

과학탐구 영역

7. 표는 허블의 은하 분류 기준과 이에 따라 분류한 은하의 종류를 나타낸 것이고, 그림은 은하 A의 가시광선 영상이다. (가)~(라)는 각각 타원 은하, 정상 나선 은하, 막대 나선 은하, 불규칙 은하 중 하나이고, A는 (가)~(라) 중 하나에 해당한다.

분류 기준	(フト)	(나)	(다)	(라)
규칙적인 구조가 있는가?	0	0	×	0
나선팔이 있는가?	0	0	×	×
중심부에 막대 구조가 있는가?	0	×	×	×




(O: 있다, x: 없다)


이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

-<보 기>-

- □. 은하의 질량에 대한 성간 물질의 질량비는 (가)가 (다)보다 작다.
- ㄴ. 은하를 구성하는 별의 평균 표면 온도는 (나)가 (라)보다 높다. C. A는 (라)에 해당한다.
- ① ¬ ② ⊏

- (3) 7, L (4) L, C (5) 7, L, C
- 8. 그림 (가)와 (나)는 어느 날 같은 시각 우리나라 부근의 가시 영상과 지상 일기도를 각각 나타낸 것이다.





이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

-<보 기>:

- ¬. 구름의 두께는 A 지역이 B 지역보다 두껍다.
- L. A 지역의 구름을 형성하는 수증기는 주로 전선의 남쪽에 위치한 기단에서 공급된다.
- C. B 지역의 지상에서는 남풍 계열의 바람이 분다.
- \bigcirc (2) L

- 37, 5 4 4, 5 5 7, 4, 5
- 9. 표는 별 (가), (나), (다)의 분광형과 절대 등급을 나타낸 것이다.

(가), (나), (다)에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]


별	분광형	절대 등급
(가)	G	0.0
(나)	A	+1.0
(다)	K	+8.0


-----<보 기>---

- ㄱ. (가)의 중심핵에서는 주로 양성자·양성자 반응(p-p 반응)이 일어난다.
- ㄴ. 단위 면적당 단위 시간에 방출하는 에너지양은 (나)가 가장
- ㄷ. (다)의 중심핵 내부에서는 주로 대류에 의해 에너지가 전달된다.
- ① ¬

- 2 L 3 L 4 7, L 5 L, L

10. 그림 (가)는 전 지구와 안면도의 대기 중 CO₂ 농도를, (나)는 전 지구와 우리나라의 기온 편차(관측값-평년값)를 나타낸 것이다.






이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?


--<보 기>-

¬. ¬ 시기 동안 CO, 평균 농도는 안면도가 전 지구보다 낮다. ㄴ. ⓒ 시기 동안 기온 상승률은 전 지구가 우리나라보다 작다. □. 전 지구 해수면의 평균 높이는 □ 시기가 □ 시기보다 낮다.

 \bigcirc 37, 4 4 4, 5 7, 4, 5 ② ⊏

11. 그림 (가)는 우리나라의 어느 해양 관측소에서 관측된 풍속과 풍향 변화를, (나)는 이 관측소의 표층 수온 변화를 나타낸 것이다. A와 B는 서로 다른 두 태풍의 영향을 받은 기간이다.





이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

-----<보 기>---

- ¬. A 시기에 태풍의 눈은 관측소를 통과하였다.
- L. B 시기에 관측소는 태풍의 안전 반원에 위치하였다.
- 다. A 시기의 급격한 수온 하강은 B 시기에 통과하는 태풍을 강화시켰다.

12. 다음은 고지자기 자료를 이용하여 대륙의 과거 위치를 알아보기 위한 탐구 활동이다.

[가정]

- 고지자기극은 고지자기 방향으로 추정한 지리상 북극이고, 지리상 북극은 변하지 않았다.
- 현재 지자기 북극은 지리상 북극과 일치한다.

[탐구 과정]

- (가) 대륙 A의 현재 위치, 1억 년 전 A의 고지자기극 위치, 회전 중심이 표시된 지구본을 준비한다.
- (나) 오른쪽 그림과 같이 회전 중심을 중심으로 1억 년 전 1억년전 A의 /지리상 북극 A의 고지자기극과 지리상 북극 사이의 각 (θ) 을 측정 하다.




(다) 회전 중심을 중심으로 A를 θ 만큼 회전시키고. 1억 년 전 A의 위치를

> 표시한 후, 현재와 1억 년 전 A의 위치를 비교한다. 회전 방향은 1억 년 전 A의 고지자기극이 (☐)을/를 향하는 방향이다.

[탐구 결과]

-) 각(θ): (
- 대륙 A의 위치 비교: 1억 년 전 A의 위치는 현재 보다 (🗓)에 위치한다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

---<보 기>-

- ㄱ. 지리상 북극은 ⑦에 해당한다.
- ㄴ. 고위도는 ▷에 해당한다.
- C. A의 고지자기 복각은 1억 년 전이 현재보다 작다.
- ① ¬
- ②

- 37, 4 4 4, 5 7, 4, 5
- 13. 그림은 북대서양 심층 순환의 세기 변화를 시간에 따라 나타낸 것이다.




A 시기와 비교할 때, B 시기의 북대서양 심층 (×10⁶ m³/s)¹⁴ 순환과 관련된 설명으로

옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

-----<보 기>---

- □. 북대서양 심층수가 형성되는 해역에서 침강이 약하다.
- ㄴ. 북대서양에서 고위도로 이동하는 표층 해류의 흐름이 강하다.
- ㄷ. 북대서양에서 저위도와 고위도의 표층 수온 차가 크다.
- \bigcirc
 - (2) L
- 37, 54, 57, 6, 5



--<보 기>-

- ¬. 표면 온도는 A가 B의 √10 배이다.
- L. 복사 에너지를 최대로 방출하는 파장은 B가 C보다 길다.
- ㄷ. 광도 계급이 V인 것은 C이다.

14. 그림은 별 A, B, C의 반지름과 절대


초거성, 거성, 주계열성 중 하나이다.

A, B, C에 대한 설명으로 옳은 것만을

<보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

- ① ¬
- ② し ③ ロ
- 4) 7, 5 5 4, 5

15. 그림은 어느 팽창 우주 모형에서 시간에 따른 우주의 크기 변화를 나타낸 것이다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

----<보 기>-

- ¬. A 시기에 우주는 감속 팽창했다.
- ㄴ. 현재 우주에서 물질이 차지하는 비율은 암흑 에너지가 차지하는 비율보다 크다.
- 다. 우주 배경 복사의 파장은 A 시기가 현재보다 길다.

- **16.** 그림은 주계열성 A와 B가 각각 A'와 B'로 진화하는 경로를 H-R도에 나타낸 것이다. B는 태양이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



-<보 기>-

- □. A가 A'로 진화하는 데 걸리는 시간은 B가 B'로 진화하는 데 걸리는 시간보다 짧다.
- L. B와 B'의 중심핵은 모두 탄소를 포함한다.
- 다. A는 B보다 최종 진화 단계에서의 밀도가 크다.

과학탐구 영역

- 17. 다음은 우리은하와 외부 은하 A, B에 대한 설명이다. 세 은하는 일직선상에 위치하며, 허블 법칙을 만족한다.
 - 우리은하에서 A까지의 거리는 20 Mpc이다.
 - B에서 우리은하를 관측하면, 우리은하는 2800 km/s의 속도로 멀어진다.
 - A에서 B를 관측하면, B의 스펙트럼에서 500 nm의 기준 파장을 갖는 흡수선이 507 nm로 관측된다.

우리은하에서 A와 B를 관측한 결과에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 허블 상수는 $70\,\mathrm{km/s/Mpc}$ 이고, 빌의 속도는 $3\times10^5\,\mathrm{km/s}$ 이다.)


-----<보 기>-

- □. A의 후퇴 속도는 1400 km/s이다.
- ㄴ. 스펙트럼에서 기준 파장이 동일한 흡수선의 파장 변화량은 B가 A의 2배이다.
- 다. A와 B는 동일한 시선 방향에 위치한다.

① ¬ ② ⊏

37, 4 4 4, 5 7, 4, 5

18. 그림 (가)는 별 A와 B의 상대적 위치 변화를 시간 순서로 배열한 것이고, (나)는 (가)의 관측 기간 동안 이 중 한 별의 밝기 변화를 나타낸 것이다. 이 기간 동안 B는 A보다 지구로부터 멀리 있고, 별과 행성에 의한 미세 중력 렌즈 현상이 관측되었다.



이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]


-----<보 기>----


- ㄱ. (나)의 ⑦ 시기에 관측자와 두 별의 중심은 일직선상에 위치한다.
- ㄴ. (나)에서 별의 겉보기 등급 최대 변화량은 1등급보다 작다.
- C. (나)로부터 A가 행성을 가지고 있다는 것을 알 수 있다.

① ¬ \bigcirc

37, 4 4 4, 5 7, 4, 5

19. 그림 (가)는 어느 지역의 지표에 나타난 화강암 A, B와 셰일 C의 분포를, (나)는 화강암 A, B에 포함된 방사성 원소의 붕괴 곡선 X, Y를 순서 없이 나타낸 것이다. A는 B를 관입하고 있고, B와 C는 부정합으로 접하고 있다. A, B에 포함된 방사성 원소의 양은 각각 처음 양의 20%와 50%이다.





A, B, C에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

-<보 기>-


- □. A에 포함된 방사성 원소의 붕괴 곡선은 X이다.
- L. 가장 오래된 암석은 B이다.
- C. C는 고생대 암석이다.


① ¬

② ⊏

37, L 4 L, L 5 7, L, L

20. 그림 (가)는 서태평양 적도 부근 해역의 표층에 도달하는 태양 복사 에너지 편차(관측값 - 평년값)를, (나)는 태평양 적도 부근 해역에서 A와 B 중 한 시기에 1년 동안 관측한 20℃ 등수온선의 깊이 편차를 나타낸 것이다. A와 B는 각각 엘니뇨와 라니냐 시기 중 하나이다.





이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

-<보 기>-

- ¬. (나)는 A에 해당한다.
- L. B일 때는 서태평양 적도 부근 해역이 평년보다 건조하다.
- □. 적도 부근에서 <mark>서태평양 해면 기압</mark>은 A가 B보다 작다.

- 2 L 3 7, L 4 L, L 5 7, L, L

- * 확인 사항
- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인

2022학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가 문제지

제 4 교시

과학탐구 영역(지구과학 I)

수험 번호 성명 제[]선택

1. 다음은 지질 시대의 특징에 대하여 학생 A, B, C가 나눈 대화를 나타낸 것이다. (가), (나), (다)는 각각 고생대, 중생대, 신생대 중 하나이다.

지질 시대	특징	
(가)	• 판게아가 분리되기 시작하였다. • 파충류가 번성하였다.	
(나)	• 히말라야 산맥이 형성되었다. • 속씨식물이 번성하였다.	
(다)	• 육상에 식물이 출현하였다. • 삼엽충이 번성하였다.	




제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은?

- ① A
- ② B
- 3 C
- 4 A, B 5 A, C

- 37, 5 4 4, 5 57, 4, 5


지 구 과 학

- 2. 그림은 북대서양의 연평균 (증발량 - 강수량) 값 분포를 나타낸 것이다.
 - 이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]



- -<보 기>
- □. 연평균 (증발량 강수량) 값은 B 지점이 A 지점보다 크다. L. B 지점은 대기 대순환에 의해 형성된 저압대에 위치한다.
- 다. 표층 염분은 C지점이 B지점보다 높다.
- \bigcirc
- (2) L
- 37, 5 4 4, 5 5 7, 4, 5
- 3. 그림은 SiO, 함량과 결정 크기에 따라 화성암 A, B, C의 상대적인 위치를 결 나타낸 것이다. A, B, C는 각각 유문암, 크 현무암, 화강암 중 하나이다.


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?




----<보 기>-

- ㄱ. C는 화강암이다.
- L. B는 A보다 천천히 냉각되어 생성된다.
- C. B는 주로 해령에서 생성된다.
- ① ¬
- ② L
- ③ ⊏
- 4) 7, L (5) L, E

4. 그림 (7)는 대서양에서 시추한 지점 $P_1 \sim P_7$ 을 나타낸 것이고, (나)는 각 지점에서 가장 오래된 퇴적물의 연령을 판의 경계로부터 거리에 따라 나타낸 것이다.





이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

----<보 기>--

- □. 가장 오래된 퇴적물의 연령은 P,가 P,보다 많다.
- L. 해저 퇴적물의 두께는 P_1 에서 P_5 로 갈수록 두꺼워진다.
- Γ . P_3 과 P_7 사이의 거리는 점점 증가할 것이다.
- \bigcirc
- ② L

- 5. 그림 (가)와 (나)는 가시광선으로 관측한 외부 은하와 퀘이사를 나타낸 것이다.








- (가) 외부 은하
- 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

---<보 기>-

- ㄱ. (가)는 불규칙 은하이다.
- ㄴ. (나)는 항성이다.
- ㄷ. (나)는 우리은하로부터 멀어지고 있다.
- \bigcirc
- ② ⊏

- 37. 4 4 4 5 7, 4 5
- 6. 그림은 화산 활동으로 형성된 하와이와 그 주변 해산들의 분포를 절대 연령과 함께 나타낸 것이다. B 지점에서 판의 이동 방향은 □과 □ 중 하나이다.
 - 이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]



-----<보 기>---

- □. A 지점의 하부에는 맨틀 대류의 하강류가 있다.
- L. B 지점의 화산은 뜨거운 플룸에 의해 형성되었다.
- □ B 지점에서 판의 이동 방향은 ¬이다.
- ① L


32

- 2 = 3 7, = 4 7, = 5 7, =, =

가

과학탐구 영역

7. 그림 (가)는 질량이 태양과 같은 주계열성의 내부 구조를, (나)는 이 별의 진화 과정을 나타낸 것이다. A와 B는 각각 대류층과 복사층 중 하나이다.





이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

-----<보 기>--

- ㄱ. 복사층은 B이다.
- L. 적색 거성의 중심핵에서는 주로 양성자·양성자 반응(p-p 반응)이 일어난다.
- □. □ 단계의 별 내부에서는 철보다 무거운 원소가 생성된다.
- ① ¬

- 8. 그림 (가)와 (나)는 어느 날 같은 시각의 지상 일기도와 적외 영상을 나타낸 것이다. 이때 우리나라 주변에는 전선을 동반한 2개의 온대 저기압이 발달하였다.






이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]


-----<보 기>---


- ㄱ. A 지점의 저기압은 폐색 전선을 동반하고 있다.
- L. B 지점은 서풍 계열의 바람이 우세하다.
- 다. C 지역에는 적란운이 발달해 있다.
- ① ¬
- ② L
- ③ ⊏
- ④ ¬, ∟ ⑤ ∟, ⊏
- 9. 그림은 어느 외계 행성계의 시선 속도를 관측하여 나타낸 것이다.
 - 이 자료에 대한 설명<u>으</u>로 옳은 ^{(m/s) -5} 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]



- ㄱ. 행성의 스펙트럼을 관측하여 얻은 자료이다.
- L. A 시기에 행성은 지구로부터 멀어지고 있다.
- 다. B 시기에 행성으로 인한 식 현상이 관측된다.

10. 그림 (가)는 지난 20년간 우리나라에서 관측한 우박의 월별 누적 발생 일수와 월별 평균 크기를 나타낸 것이고, (나)는 뇌우에서 우박이 성장하는 과정을 나타낸 모식도이다.






이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

--<보 기>---

- ㄱ. 우박은 7월에 가장 빈번하게 발생하였다.
- ㄴ. (나)에서 빙정이 우박으로 성장하기 위해서는 과냉각 물방울이 필요하다.
- ㄷ. 상승 기류는 여름철 우박의 크기가 커지는 주요 원인이다.
- ① ¬
- ② L
- 3 = 4 = 5 = =

11. 그림은 심층 해수의 연령 분포를 나타낸 것이다. 심층 해수의 연령은 해수가 표층에서 침강한 이후부터 현재까지 경과한 시간을 의미한다.



이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?


-----<보 기>----

- □. 심층 해수의 평균 연령은 북태평양이 북대서양보다 많다.
- L. A 해역에는 표층 해수가 침강하는 곳이 있다.
- 다. B에는 저위도로 흐르는 심층 해수가 있다.

과학탐구 영역


12. 다음은 기후 변화 요인 중 지구 자전축 기울기 변화의 영향을 알아보기 위한 탐구이다.

[탐구 과정]



- (가) 실험실을 어둡게 한 후 그림과 같이 밝기 측정 장치와 전구를 설치하고 전원을 켠다.
- (나) 각도기를 사용하여 ① 밝기 측정 장치와 책상 면이 이루는 각(θ)이 70°가 되도록 한다.
- (다) 밝기 센서에 측정된 밝기(lux)를 기록한다.
- (라) 밝기 센서에서 전구까지의 거리(l)와 밝기 센서의 높이(h)를 일정하게 유지하면서. θ 를 10°씩 줄이며 20°가 될 때까지 (다)의 과정을 반복한다.

[탐구 결과]





이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

-<보 기>-

- ㄱ. ⑦의 크기는 '태양의 남중 고도'에 해당한다.
- \bot . 측정된 밝기는 θ 가 클수록 감소한다.
- ㄷ. 다른 요인의 변화가 없다면 지구 자전축의 기울기가 커질수록 우리나라 기온의 연교차는 감소한다.
- \bigcirc (2) L

- 37, 5 4 4, 5 5 7, 4, 5
- 13. 그림은 동태평양 적도 부근 해역에서 관측된 수온 편차 분포를 깊이에 따라 나타낸 것이다. (가)와 (나)는 각각 엘니뇨와 라니냐 시기 중 하나이다. 편차는 (관측값 - 평년값)이다.






이 해역에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

- ㄱ. (가)는 엘니뇨 시기이다.
- ㄴ. 용승은 (나)일 때가 (가)일 때보다 강하다.
- ㄷ. (나)일 때 해수면의 높이 편차는 (-) 값이다.

14. 그림은 분광형이 서로 다른 별 (가), (나), (다)가 방출하는 복사 에너지의 상대적 세기를 파장에 따라 나타낸 것이다. (나)세 (가)의 분광형은 ○형이고, (나)와 (다)는 각각 A형과 G형 중 ^(다)세




이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]


-----<보 기>-

- □. Η Ι 흡수선의 세기는 (가)가 (나)보다 강하게 나타난다.
- ㄴ. 복사 에너지를 최대로 방출하는 파장은 (나)가 (다)보다 길다.
- ㄷ. 표면 온도는 (나)가 태양보다 높다.
- \bigcirc

하나이다.

- ② L
- ③ ⊏
- (4) 7, L (5) L, E
- 15. 그림 (가)와 (나)는 현재와 과거 어느 시기의 우주 구성 요소 비율을 순서 없이 나타낸 것이다. A, B, C는 각각 보통 물질, 암흑 물질, 암흑 에너지 중 하나이다.







이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

----<보 기>-

- ㄱ. (가)일 때 우주는 가속 팽창하고 있다.
- L. B는 전자기파로 관측할 수 있다.
- C의 비율(가)일 때와 (나)일 때 같다.
- \bigcirc
- (2) L
- ③ ⊏
- 47, 6 5 4, 5
- 16. 그림 (가)는 어느 쇄설성 퇴적층의 단면을, (나)는 속성 작용이 일어나는 동안 (가)의 모래층에서 모래 입자 사이 공간(①)의 부피 변화를 나타낸 것이다.







(가)의 모래층에서 속성 작용이 일어나는 동안 나타나는 변화에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 句에 교결 물질이 침전된다.
- ㄴ. 밀도는 증가한다.
- □. 단위 부피당 모래 입자의 개수는 A에서 B로 갈수록 감소한다.

과학탐구 영역

17. 그림 (가)는 별의 질량에 따라 주계열 단계에 도달하였을 때의 광도와 이 단계에 머무는 시간을, (나)는 주계열성을 H-R도에 나타낸 것이다. A와 B는 각각 광도와 시간 중 하나이다.






이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

-<보 기>-

- ¬. B는 광도이다.
- ㄴ. 질량이 M인 별의 표면 온도는 T_2 이다.
- 다. 표면 온도가 T_3 인 별은 T_1 인 별보다 주계열 단계에 머무는 시간이 100배 이상 길다.


18. 그림 (가)와 (나)는 어느 날 동일한 태풍의 영향을 받은 우리나라 관측소 A와 B에서 측정한 기압, 풍속, 풍향의 변화를 순서 없이 나타낸 것이다.



이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 최대 풍속은 B가 A보다 크다.
- L. 태풍 중심까지의 최단 거리는 A가 B보다 가깝다.
- C. B는 태풍의 안전 반원에 위치한다.

19. 그림은 우주의 나이가 38만 년일 때 A와 B의 위치에서 출발한 우주 배경 복사를 우리은하에서 관측하는 상황을 가정하여 나타낸 것이다. (가)와 (나)는 우주의 나이가 각각 138억 년과 60억 년일 때이다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]


-<보 기>--

- □. A와 B로부터 출발한 우주 배경 복사의 온도가 (가)에서 거의 같게 측정되는 것은 우주의 급팽창으로 설명된다.
- L. (나)에서 측정되는 우주 배경 복사의 온도는 2.7 K보다 높다.
- C. A에서 출발한 우주 배경 복사는 (나)의 우리은하에 도달한다.

① 7 2 2 3 7, 4 4 4, 5 7, 4, 5

20. 그림 (r)는 어느 지역의 지질 단면도로, A~E는 퇴적암, F와 G는 화성암, f-f'은 단층이다. 그림 (r)는 F와 G에 포함된 방사성 원소 X의 함량을 붕괴 곡선에 나타낸 것이다. X의 반감기는 1억 년이다.





이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

-<보 기>

- ¬. A는 고생대에 퇴적되었다.
- ㄴ. D가 퇴적된 이후 f f'이 형성되었다.
- ㄷ. 단층 상반에 위치한 F는 최소 2회 육상에 노출되었다.

- * 확인 사항
- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인 하시오.

제 4 교시

과학탐구 영역(지구과학I)

성명 수험 번호 제[]선택

1. 그림은 주요 동물군의 생존 시기를 나타낸 것이다. A, B, C는 어류, 파충류, 포유류를 순서 없이 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

-----<보 기>-

- ¬. A는 어류이다.
- L. C는 신생대에 번성하였다.
- 다. B가 최초로 출현한 시기와 C가 최초로 출현한 시기 사이에 히말라야 산맥이 형성되었다.
- \bigcirc
- (2) L
- (3) □
- 47, 6 5 4, 5
- 2. 다음은 우주의 구성 요소에 대하여 학생 A, B, C가 나눈 대화이다. ①과 ①은 각각 암흑 물질과 암흑 에너지 중 하나이다.


구성 요소	특징
9	질량을 가지고 있으나 빛으로 관측되지 않음.
©	척력으로 작용하여 우주를 가속 팽창시키는 역할을 함.



제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은?

- ① A
- ② B
- ③ C
- 4 A, B 5 A, C
- 3. 그림은 대서양의 심층 순환을 나타낸 것이다. 수괴 A, B, C는 각각 남극 저층수, 남극 중층수, 북대서양 심층수 중 하나이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]




----<보 기>-

- 기. A는 남극 저층수이다.
- L. 밀도는 C가 A보다 크다.
- 다. 빙하가 녹은 물이 해역 P에 유입되면 B의 흐름은 강해질
- ① ¬
- 2 L
- ③ ⊏
- 47, 5 5 4, 5

4. 다음은 어느 지질 구조의 형성 과정을 알아보기 위한 탐구이다.

[탐구 과정]


- (가) 지점토 판 세 개를 하나씩 순서대로 쌓은 뒤, I과 같이 경사지게 지점토 칼로 자른다.
- (나) 잘린 지점토 판 전체를 조심스럽게 들어 올리고, Ⅱ와 같이 □ 양쪽 끝을 서서히 잡아당겨 가운데 조각이 내려가도록 한다.
- (다) Ⅲ과 같이 지점토 칼로 지점토 판의 위쪽을 수평으로 자른다.
- (라) 잘린 지점토 판 위에 IV와 같이 새로운 지점토 판을 수평이 되도록 쌓는다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

----<보 기>-

- ㄱ. 句에 해당하는 힘은 횡압력이다.
- ㄴ. (다)는 지층의 침식 과정에 해당한다.
- ㄷ. (라)에서 부정합 형태의 지질 구조가 만들어진다.
- ① ¬
- (2) L
- ③ ⊏
- 47, 6 5 4, 5
- 5. 그림 (가)는 2004년부터의 그린란드 빙하의 누적 융해량을, (나)는 전 지구에서 일어난 빙하 융해와 해수 열팽창에 의한 평균 해수면의 높이 편차(관측값 - 2004년 값)를 나타낸 것이다.





이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

-----<보 기>----

- ㄱ. 그린란드 빙하의 융해량은 ⑦ 기간이 ◎ 기간보다 많다.
- ㄴ. (나)에서 해수 열팽창에 의한 평균 해수면 높이 편차는 2015년이 2010년보다 크다.
- ㄷ. (나)의 전 기간 동안, 평균 해수면 높이의 평균 상승률은 해수 열팽창에 의한 것이 빙하 융해에 의한 것보다 크다.
- \bigcirc
- ② L
- 37, 54, 57, 6, 5

과학탐구 영역

6. 표는 서로 다른 외계 행성계에 속한 행성 (가)와 (나)에 대한 물리량을 나타낸 것이다. (가)와 (나)는 생명 가능 지대에 위치하고, 각각의 중심별은 주계열성이다.


외계 행성	중심별의 광도 (태양 = 1)	중심별로부터의 거리(AU)	단위 시간당 단위 면적이 받는 복사 에너지양(지구=1)
(가)	0.0005	9	1
(나)	1.2	1	©.

이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

----<보 기>-

- ㄱ. ⑦은 1보다 작다.
- ㄴ. ⓒ은 1보다 작다.
- ㄷ. 생명 가능 지대의 폭은 (나)의 중심별이 (가)의 중심별 보다 좁다.

- 7. 그림은 잘 발달한 태풍의 🕇 물리량을 태풍 중심으로부터의 휴 거리에 따라 개략적으로 나타낸 것이다. A, B, C는 해수면 상의 강수량, 기압, 풍속을 순서 없이 나타낸 것이다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?


----<보 기>-

- □. B는 강수량이다.
- ㄴ. 지역 ⑤에서는 상승 기류가 나타난다.
- □. 일기도에서 등압선 간격은 지역 ⓒ에서가 지역 ⓒ에서보다 조밀하다.

① ¬

- 2 3 4 7, 5 -, -
- 8. 그림 (가)와 (나)는 남아메리카와 아프리카 주변에서 발생한 지진의 진앙 분포를 나타낸 것이다.





지역 ③과 ⑥에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?


-----<보 기>--

- ㄱ. □의 하부에는 침강하는 해양판이 잡아당기는 힘이 작용한다.
- ㄴ. 心의 하부에는 외핵과 맨틀의 경계부에서 상승하는 플룸이
- ㄷ. 진원의 평균 깊이는 □이 ▷보다 깊다.

① 7 ② ⊏

3) 7, 4 4) 4, 5 7, 4, 5

9. 그림은 두 은하 A와 B가 탄생한 후, 연간 생성된 별의 총질량을 시간에 따라 나타낸 (태양질량/년) 25 것이다. A와 B는 허블 은하 분류 체계에 따른 서로 다른 종류이며,



각각 E0과 Sb 중 하나이다.


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?


-----<보 기>---

- ㄱ. B는 나선팔을 가지고 있다.
- ㄴ. T_1 일 때 연간 생성된 별의 총질량은 A가 B보다 크다.
- \Box . T_2 일 때 별의 평균 표면 온도는 B가 A보다 높다.

① ¬

- 10. 그림 (가)와 (나)는 장마 기간 중 어느 날 같은 시각 우리나라 부근의 지상 일기도와 적외 영상을 각각 나타낸 것이다.






이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

----<보 기>---

- □. 북태평양 고기압은 고온 다습한 공기를 우리나라로 공급한다.
- ㄴ. 125°E에서 장마 전선은 지점 a와 지점 b 사이에 위치한다.
- 다. 구름 최상부의 온도는 영역 A가 영역 B보다 높다.
- ① ¬
- - 2 3 7, 5 4 -, 5 7, -, 5
- 11. 그림은 주계열성 ①, ①, ②의 반지름과 표면 온도를 나타낸 것이다.
 - 이에 대한 설명으로 옳은 ^(태양=1) 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]




-----<보 기>----

- ¬. ¬이 주계열 단계를 벗어나면 중심핵에서 CNO 순환 반응이 일어난다.
- ㄴ. 心의 중심핵에서는 주로 대류에 의해 에너지가 전달된다. ㄷ. ②은 백색 왜성으로 진화한다.

과학탐구 영역

지구과학I

12. 그림 (가)는 어느 날 우리나라 주변 표층 해수의 수온과 염분 분포를, (나)는 수온 - 염분도를 나타낸 것이다.




이 자료에서 해역 A, B, C의 표층 해수에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

-----<보 기>----

- □. 강물의 유입으로 A의 염분이 주변보다 낮다.
- ㄴ. 밀도는 B가 C보다 작다.
- 다. 수온만을 고려할 때, 산소 기체의 용해도는 B가 C보다 작다.

13. 그림은 대륙과 해양의 지하 온도 분포를 나타낸 것이고, ☐, ⓒ, ⓒ은 암석의 용융 곡선이다.



이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

-----<보 기>----

- \neg . $a \rightarrow a'$ 과정으로 생성되는 마그마는 $b \rightarrow b'$ 과정으로 생성되는 마그마보다 SiO_2 함량이 많다.
- $L. \ b \rightarrow b'$ 과정으로 상승하고 있는 물질은 주위보다 온도가 높다.
- 다. 물의 공급에 의해 맨틀 물질의 용융이 시작되는 깊이는 해양 하부에서가 대륙 하부에서보다 깊다.

14. 표는 여러 별들의 절대 등급을 분광형과 광도 계급에 따라 구분하여 나타낸 것이다. (가), (나), (다)는 광도 계급 Ib(초거성), Ⅲ(거성), Ⅴ(주계열성)를 순서 없이 나타낸 것이다.


광도 계급 분광형	(가)	(나)	(다)
В0	-4.1	-5.0	-6.2
A0	+0.6	-0.6	-4.9
G0	+4.4	+0.6	-4.5
M0	+9.2	-0.4	-4.5

이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

---<보 기>-

- ㄱ. (가)는 Ⅴ(주계열성)이다.
- ㄴ. (나)에서 광도가 가장 작은 별의 표면 온도가 가장 낮다.
- ㄷ. (다)에서 별의 반지름은 G0인 별이 M0인 별보다 작다.


15. 그림은 해수면 부근에서 부는 바람의 남북 방향의 연평균 풍속을 나타낸 것이다. ①과 ①은 각각 60°N과 60°S 중 하나이다.



이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

----<보 기>---

- ㄱ. ①은 60°S이다.
- L. A에서 해들리 순환의 하강 기류가 나타난다.
- ㄷ. 페루 해류는 B에서 나타난다.
- 16. 그림 (가)와 (나)는 각각 COBE 우주 망원경과 WMAP 우주 망원경으로 관측한 우주 배경 복사의 온도 편차를 나타낸 것이다. 지점 A와 B는 지구에서 관측한 시선 방향이 서로 반대이다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]


-----<보 기>-----

- 그. (나)가 (가)보다 온도 편차의 형태가 더욱 세밀해 보이는 것은 관측 기술의 발달 때문이다.
- L. A와 B는 빛을 통하여 현재 상호 작용할 수 있다.
- 다. A와 B의 온도가 거의 같다는 사실은 급팽창 우주론으로 설명할 수 있다.

과학탐구 영역

17. 그림 (가)는 어느 지역의 깊이에 따른 지층과 화성암의 연령을, (나)는 방사성 원소 X와 Y의 붕괴 곡선을 나타낸 것이다. 화성암 B와 D는 X와 Y 중 서로 다른 한 종류만 포함하고, 현재 B와 D에 포함된 방사성 원소의 함량은 각각 처음 양의 50%와 25%이다.






이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]




- □. A층 하부의 기저 역암에는 B의 암석 조각이 있다.
- L. 반감기는 X가 Y의 2배이다.
- C. B와 D의 연령 차는 3억 년이다.

 \bigcirc (2) L 37, 5 4 4, 5 7, 4, 5

18. 그림 (가)와 (나)는 서로 다른 외계 행성계에서 행성이 식 현상을 일으킬 때, 중심별의 상대적 밝기 변화를 시간에 따라 나타낸 것이다. 두 중심별의 반지름은 같고, 각 행성은 원궤도를 따라 공전하며, 공전 궤도면은 관측자의 시선 방향과 나란하다.






이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

----<보 기>-

- ㄱ. 식 현상이 지속되는 시간은 (가)가 (나)보다 길다.
- ㄴ. (가)의 행성 반지름은 (나)의 행성 반지름의 0.3배이다.
- ㄷ. 중심별의 흡수선 파장은 식 현상이 시작되기 직전이 식 현상이 끝난 직후보다 길다.

19. 그림은 남아메리카 대륙의 현재 위치와 시기별 고지자기극의 위치를 나타낸 것이다. 고지자기극은 남아메리카 대륙의 고지자기 방향으로 추정한 지리상 남극이고, 지리상 남극은 변하지 않았다. 현재 지자기 남극은 지리상 남극과 일치한다.





대륙 위의 지점 A에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

-<보 기>

- □. 500 Ma에는 북반구에 위치하였다.
- L. 복각의 절댓값은 300 Ma일 때가 250 Ma일 때보다 컸다.
- □. 250 Ma일 때는 170 Ma일 때보다 북쪽에 위치하였다.
- \bigcirc
- (2) L
- ③ ⊏
- 47, 57, 5

20. 그림의 유형 I과 II는 두 물리량 x와 y 사이의 대략적인 관계를 나타낸 것이다. 표는 엘니뇨와 라니냐가 일어난 시기에 태평양 적도 부근 해역에서 동시에 관측한 물리량과 이들의 관계 유형을 Ⅰ 또는 Ⅱ로 나타낸 것이다.





물리량 관계 유형	x	y
(a)	동태평양에서 적운형 구름양의 편차	(서태평양 해수면 높이 - 동태평양 해수면 높이)의 편차
I	서태평양에서의 해면 기압 편차	(🗇)의 편차
(b)	(서태평양 해수면 수온 - 동태평양 해수면 수온)의 편차	워커 순환 세기의 편차

(편차 = 관측값 - 평년값)

이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

-<보 기>

- ㄱ. @는 Ⅱ이다.
- ㄴ. '동태평양에서 수온 약층이 나타나기 시작하는 깊이'는 ③에 해당한다.
- 다. ⓑ는 I이다.
- ① ¬

- * 확인 사항
- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인

2022학년도 대학수학능력시험 문제지

제 4 교시

과학탐구 영역(지구과학 I)

수험 번호 성명 제[]선택

〔실험 목표〕

[실험 과정]

〔실험 결과〕


것은? [3점]

 \bigcirc

원통에 넣는다.

1. 그림 (가)는 우리나라에 영향을 준 어느 황사의 발원지와 관측소 A와 B의 위치를 나타낸 것이고 (나)는 A와 B에서 측정한 이 황사 농도를 □과 ○으로 순서 없이 나타낸 것이다.






이 황사에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

----<보 기>--


- □. A에서 측정한 황사 농도는 □이다.
- ㄴ. 발원지에서 5월 30일에 발생하였다.
- 다. 무역풍을 타고 이동하였다.
- \bigcirc
- (2) L

- 37, 5 4 4, 5 57, 4, 5
- 2. 그림은 플룸 구조론을 나타낸 모식도이다. A와 B는 각각 차가운 플룸과 뜨거운 플룸 중 하나이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



- □. A는 차가운 플룸이다.
- L. B에 의해 호상 열도가 형성된다.
- □. 상부 맨틀과 하부 맨틀 사이의 경계에서 B가 생성된다.
- \bigcirc
- 2 L
- ③ ⊏
- 4) 7, 6 5 7, 6
- 3. 그림은 어느 고위도 해역에서 A 시기와 B 시기에 각각 측정한 A 시기와 B 시기에 각각 특성만 $^{\circ}_{\uparrow}$ 깊이 $50 \sim 500 \,\mathrm{m}$ 의 해수 특성을 $^{\circ}_{(\mathbb{C})}$ $^{\circ}$ 수온 - 염분도에 나타낸 것이다. 이 해역의 수온과 염분은 유입된 담수의 양에 의해서만 변화하였다.




이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

-----<보 기>-----

- ¬. A 시기에 깊이가 증가할수록 밀도는 증가한다.
- L. 50 m 깊이에서 산소의 용해도는 A 시기가 B 시기보다 높다.
- □. 유입된 담수의 양은 A 시기가 B 시기보다 적다.
- ① ¬

5. 그림은 전파 은하 M87의 가시광선 영상과 전파 영상을 나타낸 것이다.

가시광선 영상 전파 영상 전파 영상



4. 다음은 어느 퇴적 구조가 형성되는 원리를 알아보기 위한 실험이다.

(가) 입자의 크기가 2 mm 이하인 모래, 2~4 mm인 왕모래, 4~6 mm인 잔자갈을 각각 100 g씩 준비하여 물이 담긴

(나) 원통을 흔들어 입자들을 골고루 섞은 후, 원통을 세워

모래

□ 왕모래

■ 잔자갈

37, 5 4 4, 5 57, 4, 5

○ (□)의 형성 원리를 설명할 수 있다.

입자들이 가라앉기를 기다린다. (다) 그림과 같이 원통의 퇴적물을 같은 간격의

(라) 각 구간의 퇴적물을 모래, 왕모래, 잔자갈로

구분하여 각각의 질량을 측정한다.

○ A, B, C 구간별 입자 종류에 따른 질량비

50 질량비(%)

○ 퇴적물 입자의 크기가 클수록 (□) 가라앉는다.

---<보 기>-

ㄷ. 경사가 급한 해저에서 빠르게 이동하던 퇴적물의 유속이

갑자기 느려지면서 퇴적되는 과정은 (나)에 해당한다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른

세 구간 A, B, C로 나눈다.

ㄱ. '점이 층리'는 ①에 해당한다.

ㄴ. '느리게'는 ⓒ에 해당한다.

② L



이 은하에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로

-----<보 기>----

- ㄱ. 은하를 구성하는 별들은 푸른 별이 붉은 별보다 많다.
- ㄴ. 제트에서는 별이 활발하게 탄생한다.
- ㄷ. 중심에는 질량이 거대한 블랙홀이 있다.
- ① ¬

고른 것은?

과학탐구 영역

6. 그림은 지질 시대에 일어난 주요 사건을 시간 순서대로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?


---<보 기>-

- ¬. A 기간에 최초의 척추동물이 출현하였다.
- L. B 기간에 판게아가 분리되기 시작하였다.
- 다. B 기간의 지층에서는 양치식물 화석이 발견된다.
- \bigcirc
- (2) L

- 7. 그림은 빅뱅 우주론에 따라 팽창하는 우주에서 물질, 암흑 에너지, 우주 배경 복사를 시간에 따라 나타낸 것이다.








• 물질(보통 물질+암흑 물질) 암흑 에너지


시간(우주의 나이)


시간이 흐름에 따라 나타나는 우주의 변화에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



- ㄱ. 물질 밀도는 일정하다.
- ㄴ. 우주 배경 복사의 온도는 감소한다.
- ㄷ. 물질 밀도에 대한 암흑 에너지 밀도의 비는 증가한다.
- \bigcirc
- (2) L

- 37, 54, 57, 6, 5
- 8. 그림 (가)는 어느 태풍이 이동하는 동안 관측소 P에서 관측한 기압과 풍속을 ③과 ①으로 순서 없이 나타낸 것이고, (나)는 이 기간 중 어느 한 시점에 촬영한 가시 영상에 태풍의 이동 경로, 태풍의 눈의 위치, P의 위치를 나타낸 것이다.







이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]


----<보 기>-

- ㄱ. 기압은 □이다.
- ㄴ. (가)의 기간 동안 P에서 풍향은 시계 반대 방향으로 변했다.
- ㄷ. (나)의 영상은 (가)에서 풍속이 최소일 때 촬영한 것이다.
- \bigcirc
- ② L
- ③ ⊏
- 47, 6, 5, 6

9. 그림 (가)는 깊이에 따른 지하의 온도 분포와 암석의 용융 곡선을 나타낸 것이고, (나)는 반려암과 화강암을 A와 B로 순서 없이 나타낸 것이다. A와 B는 각각 (가)의 ① 과정과 ① 과정으로 생성된 마그마가 굳어진 암석 중 하나이다.








이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

---<보 기>---

- ¬. ¬ 과정으로 생성된 마그마가 굳으면 B가 된다.
- ㄴ. ① 과정에서는 열이 공급되지 않아도 마그마가 생성된다.
- ㄷ. SiO, 함량(%)은 A가 B보다 높다.
- \bigcirc
- ② ⊏

- 37, 4 4 4, 5 7, 4, 5
- 10. 그림은 평균 해면 기압을 위도에 따라 나타낸 것이다.




이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

---<보 기>---

- 기. A는 대기 대순환의 간접 순환 영역에 위치한다.
- L. B 해역에서는 남극 순환류가 흐른다.
- C. C 해역에서는 대기 대순환에 의해 표층 해수가 발산한다.
- ① ¬
 - ② ⊏

- 37, L 4 L, L 5 7, L, L
- **11.** 그림은 별 A, B, C를 H-R도에 나타낸 ↑ 것이다.
 - 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기> 에서 있는 대로 고든 것은?




-<보 기>--


- □. 별의 중심으로부터 생명 가능 지대까지의 거리는 A와 B가 같다.
- L. 생명 가능 지대의 폭은 B가 C보다 넓다.
- ㄷ. 생명 가능 지대에 위치하는 행성에서 액체 상태의 물이 존재할 수 있는 시간은 C가 A보다 길다.
- 1 7

과학탐구 영역

지구과학

12. 그림 (가)와 (나)는 우리나라에 온대 저기압이 위치할 때, 온난 전선과 한랭 전선 주변의 지상 기온 분포를 순서 없이 나타낸 것이다.





이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

-----<보 기>----

- ㄱ. 온난 전선 주변의 지상 기온 분포는 (가)이다.
- L. A 지역의 상공에는 전선면이 나타난다.
- C. B 지역에서는 북풍 계열의 바람이 분다.

① ¬ ② ⊏

3 7, 4 4 4, 5 7, 4, 5

13. 표는 별 (가), (나), (다)의 분광형, 반지름, 광도를 나타낸 것이다.

별	분광형	반지름 (태양 = 1)	광도 (태양 = 1)
(フト)	()	10	10
(나)	A0	5	()
(다)	A0	()	10

(가), (나), (다)에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

----<보 기>--

- □. 복사 에너지를 최대로 방출하는 파장은 (가)가 가장 짧다.
- ㄴ. 절대 등급은 (나)가 가장 작다.
- ㄷ. 반지름은 (다)가 가장 크다.


① ¬

2 L

③ ⊏

④ ¬, ∟ ⑤ ∟, ⊏

14. 그림은 동태평양 적도 부근 해역에서 A 시기와 B 시기에 관측한 구름의 양을 높이에 따라 나타낸 것이다. A와 B는 각각 엘니뇨 시기와 평상시 (km) 중 하나이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

¬. A는 엘니뇨 시기이다.

- L. 서태평양 적도 부근 해역에서 상승 기류는 A가 B보다 활발하다.
- ㄷ. 동태평양 적도 부근 해역에서 수온 약층이 나타나기 시작 하는 깊이는 A가 B보다 얕다.

① ¬

(2) L

37, 5 4 4, 5 7, 6, 5

15. 표는 주계열성 A, B, C를 각각 원 궤도로 공전하는 외계 행성 a, b, c의 공전 궤도 반지름, 질량, 반지름을 나타낸 것이다. 세 별의 질량과 반지름은 각각 같으며, 행성의 공전 궤도면은 관측자의 시선 방향과 나란하다.


외계 행성	공전 궤도 반지름	질량	반지름
행성	(AU)	(목성 =1)	(목성 =1)
a	1	1	2
b	1	2	1
С	2	2	1

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A, B, C의 시선 속도 변화는 각각 a, b, c와의 공통 질량 중심을 공전하는 과정에서만 나타난다.) [3점]


- □. 시선 속도 변화량은 A가 B보다 작다.
- ㄴ. 별과 공통 질량 중심 사이의 거리는 B가 C보다 짧다.
- □. 행성의 식 현상에 의한 겉보기 밝기 변화는 A가 C보다 작다.


① ¬


16. 그림은 습곡과 단층이 나타나는 어느 지역의 지질 단면도이다.



X-Y 구간에 해당하는 지층의 연령 분포로 가장 적절한 것은? [3점]








과학탐구 영역

17. 그림 (가)는 현재와 A 시기의 지구 공전 궤도를, (나)는 현재와 A 시기의 지구 자전축 방향을 나타낸 것이다. (가)의 ⑦, ℂ, ℂ은 공전 궤도상에서 지구의 위치이다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?(단, 지구의 공전 궤도 이심률, 세차 운동 이외의 요인은 변하지 않는다고 가정한다.)



- ㄱ. ⊙에서 북반구는 여름이다.
- ∟. 37°N에서 연교차는 현재가 A 시기보다 작다.
- □. 37°S에서 태양이 남중했을 때, 지표에 도달하는 태양 복사에너지양은 ⓒ이 ⓒ보다 적다.

18. 그림은 별 A와 B가 주계열 단계가 끝난 직후부터 진화하는 동안의 반지름과 표면 온도 변화를 나타낸 것이다. A와 B의 질량은 각각 태양 질량의 1배와 6배 중 하나이다.




이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

----<보 기>-

- ㄱ. 진화 속도는 A가 B보다 빠르다.
- L. 절대 등급의 변화 폭은 A가 B보다 크다.
- 다. 주계열 단계일 때, 대류가 일어나는 영역의 평균 온도는 A가 B보다 높다.

19. 그림은 고정된 열점에서 형성된 화산섬 A, B, C를, 표는 A, B, C의 연령, 위도, 고지자기 복각을 나타낸 것이다. A, B, C는 동일 경도에 위치한다.




화산섬	A	В	С
연령(백만 년)	0	15	40
위도	10°N	20°N	40°N
고지자기 복각	()	(🗇)	(🗓)

이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 고지자기극은 고지자기 방향으로 추정한 지리상 북극이고, 지리상 북극은 변하지 않았다.) [3점]



- ㄱ. ⑦은 ▷보다 작다.
- ㄴ. 판의 이동 방향은 북쪽이다.
- □. B에서 구한 고지자기극의 위도는 80°N이다.
- **20.** 그림은 외부 은하 A와 B에서 각각 발견된 Ia형 초신성의 겉보기 밝기를 시간에 따라 나타낸 것이다. 우리은하에서 관측하였을 때 A와 B의 시선 방향은 60° 를 이루고, F_0 은 Ia형 초신성이 $100~\rm Mpc$ 에 있을 때 겉보기 밝기의 최댓값이다.



이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 빛의 속도는 $3 \times 10^5 \, \mathrm{km/s}$ 이고, 허블 상수는 $70 \, \mathrm{km/s/Mpc}$ 이며, 두 은하는 허블 법칙을 만족한다.) [3점]


- □. 우리은하에서 관측한 A의 후퇴 속도는 1750 km/s이다.
- 나. 우리은하에서 B를 관측하면, 기준 파장이 600 nm인 흡수선은 603.5 nm로 관측된다.
- 다. A에서 B의 Ia형 초신성을 관측하면, 겉보기 밝기의 최댓값은 $\frac{4}{\sqrt{3}} F_0$ 이다.
- * 확인 사항
- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인 하시오.

제 4 교시

과학탐구 영역(지구과학 I)

성명 수험 번호 제[]선택

1. 다음은 초대륙의 형성과 분리 과정 중 일부에 대하여 학생 A, B, C가 나눈 대화를 나타낸 것이다.



제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은?


- ① A ② B

- ③ A, C ④ B, C ⑤ A, B, C
- 2. 그림은 어느 외부 은하를 나타낸 것이다. A와 B는 각각 은하의 중심부와 나선팔이다.
 - 이 은하에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



----<보 기>-

- ㄱ. 막대 나선 은하에 해당한다.
- L. B에는 성간 물질이 존재하지 않는다.
- 다. 붉은 별의 비율은 A가 B보다 높다.
- \bigcirc
- (2) L
- ③ ⊏
- ④ ¬, ∟ ⑤ ∟. ⊏
- 3. 그림은 1750년 대비 2011년의 지구 기온 변화를 요인별로 나타낸 것이다.



이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

----<보 기>----

- □. 기온 변화에 대한 영향은 □이 자연적 요인보다 크다.
- ㄴ. 인위적 요인 중 ▷은 기온을 상승시킨다.
- ㄷ. 자연적 요인에는 태양 활동이 포함된다.
- ① ¬
- ② L
- ③ ⊏
- 47, 5 5 4, 5

4. 다음은 어느 플룸의 연직 이동 원리를 알아보기 위한 실험이다.

[실험 목표]


○ (A)의 연직 이동 원리를 설명할 수 있다.

[실험 과정]

- (가) 비커에 5°C 물 800 mL를 담는다.
- (나) 그림과 같이 비커 바닥에 수성 잉크 소량을 스포이트로 주입한다.
- (다) 비커 바닥의 물이 고르게 착색된 후, 비커 바닥 중앙을 촛불로 30초간 가열하면서 착색된 물이 움직이는 모습을 관찰한다.



○ 그림과 같이 착색된 물이 밀도 차에 의해 (B)하는 모습이 관찰되었다.





이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

----<보 기>-

- ㄱ. '뜨거운 플룸'은 A에 해당한다.
- ㄴ. '상승'은 B에 해당한다.
- ㄷ. 플룸은 내핵과 외핵의 경계에서 생성된다.
- ① ¬
- ② ⊏
- 37, 4 4 4, 5 7, 4, 5

- 5. 그림 (가)와 (나)는 어느 해 A, B 시기에 우리나라 두 해역에서 측정한 연직 수온 자료를 각각 나타낸 것이다.






이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

----<보 기>---

- ¬. (가)에서 50m 깊이의 수온과 표층 수온의 차이는 B가 A보다 크다.
- L. A와 B의 표층 수온 차이는 (가)가 (나)보다 크다.
- 다. B의 혼합층 두께는 (나)가 (가)보다 두껍다.

과학탐구 영역

6. 그림 (가)는 판의 경계를, (나)는 어느 단층 구조를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. A 지역에서는 주향 이동 단층이 발달하다.
- ㄴ. ①은 상반이다.
- ㄷ. (나)는 C 지역에서가 B 지역에서보다 잘 나타난다.
- ① ¬ ② ¬
- 3 7, 5 4 4, 5 5 7, 6, 5
- 7. 표는 별 (가), (나), (다)의 분광형과 절대 등급을 나타낸 것이다. (가), (나), (다) 중 2개는 주계열성, 1개는 초거성이다.


별	분광형	절대 등급
(フト)	G	-5
(나)	A	0
(다)	G	+5

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

-----<보 기>---

- ㄱ. 질량은 (다)가 (나)보다 크다.
- ㄴ. 생명 가능 지대에서 액체 상태의 물이 존재할 수 있는 시간은 (다)가 (나)보다 길다.
- ㄷ. 생명 가능 지대의 폭은 (다)가 (가)보다 넓다.
- ① ¬

- 8. 그림 (가)는 어느 태풍이 우리나라 부근을 지나는 어느 날 21 시에 촬영한 적외 영상에 태풍 중심의 이동 경로를 나타낸 것이고, (나)는 다음 날 05 시부터 3 시간 간격으로 우리나라 어느 관측소에서 관측한 기상 요소를 나타낸 것이다.










(나)



이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

- □. (가)에서 태풍의 최상층 공기는 주로 바깥쪽으로 불어 나간다.
- L. (가)에서 구름 최상부의 고도는 B 지역이 A 지역보다 높다.
- ㄷ. 관측소는 태풍의 안전 반원에 위치하였다.

9. 그림은 어느 지역의 지질 단면을 나타낸 것이다. 지층 A에서는 삼엽충 화석이, 지층 C와 D에서는 공룡 화석이 발견되었다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- 기. F에서는 고생대 암석이 포획암으로 나타날 수 있다.
- ㄴ. 단층이 형성된 시기에 암모나이트가 번성하였다.
- ㄷ. 습곡은 고생대에 형성되었다.

- 10. 그림은 우주에서 일어난 주요한 사건 (가)~(라)를 시간 순서대로 나타낸 것이다.


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]




----<보 기>---

- ㄱ. (가)와 (라) 사이에 우주는 감속 팽창한다.
- ㄴ. (나)와 (다) 사이에 퀘이사가 형성된다.
- ㄷ. (라) 시기에 우주 배경 복사 온도는 2.7K보다 높다.
- ① ¬

- 11. 그림 (가)와 (나)는 어느 해 2월과 8월의 남태평양의 표층 수온을 순서 없이 나타낸 것이다. A와 B는 주요 표층 해류가 흐르는 해역이다.







이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

----<보 기>--

- ㄱ. 8월에 해당하는 것은 (나)이다.
- L. A에서 흐르는 해류는 고위도 방향으로 에너지를 이동시킨다.
- □. B에서 흐르는 해류와 북태평양 해류의 방향은 반대이다.

12. 그림 (가)는 $T_1 \to T_2$ 동안 온대 저기압의 이동 경로를, (나)는 관측소 P에서 $T_1,\ T_2$ 시각에 관측한 높이에 따른 기온을 나타낸 것이다. 이 기간 동안 (가)의 온난 전선과 한랭 전선 중 하나가 P를 통과하였다.





이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

---<보 기>---


- ¬. (나)에서 높이에 따른 기온 감소율은 T₁이 T₂보다 작다.
- L. P를 통과한 전선은 한랭 전선이다.
- C. P에서 전선이 통과하는 동안 풍향은 시계 방향으로 바뀌었다.


 \bigcirc

(2) L

37, 5 4 4, 5 5 7, 6, 5

13. 그림 (가)는 깊이에 따른 지하 온도 분포와 암석의 용융 곡선 ①, ①, ⑤을, (나)는 마그마가 생성되는 지역 A, B를 나타낸 것이다.





이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

―<보 기>―

- ㄱ. 물이 포함되지 않은 암석의 용융 곡선은 ▷이다.
- L. B에서는 섬록암이 생성될 수 있다.
- ㄷ. A에서는 주로 b→b' 과정에 의해 마그마가 생성된다.

1) L

② ㄷ

37, 47, 57, 4, 5


14. 표는 우주 구성 요소 A, B, C의 상대적 비율을 T_1 , T_2 시기에 따라 나타낸 것이다. T_1 , T_2 는 각각 과거와 미래 중 하나에 해당하고, A, B, C는 각각 보통 물질, 암흑 L 물질, 암흑 에너지 중 하나이다.


구성 요소	T_1	T_2	
A	66	11	
В	22	87	
С	12	2	
(타인 · %)			

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ¬. T₂는 미래에 해당한다.
- L. A는 항성 질량의 대부분을 차지한다.
- 다. C는 전자기파로 관측할 수 있다.

15. 그림 (가)는 태양이 $A_0 \rightarrow A_1 \rightarrow A_2$ 로 진화하는 경로를 H-R도에 나타낸 것이고, (나)는 A₀, A₁, A₂ 중 하나의 내부 구조를 나타낸 것이다.





이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

一<보 기>-

- ¬. (나)는 A₀의 내부 구조이다.
- L. 수소의 총 질량은 A₂가 A₀보다 작다.
- C. An에서 An로 진화하는 동안 중심핵은 정역학 평형 상태를 유지한다.


① ¬

② L

③ ⊏

④ ¬, ∟ ⑤ ∟, ⊏

16. 그림은 동태평양 적도 부근 해역의 강수량 편차와 수온 약층 시작 깊이 편차를 나타낸 것이다. A, B, C는 각각 엘니뇨와 라니냐 시기 중 하나이고, 편차는 (관측값 - 평년값)이다.




이 해역에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- □. 강수량은 A가 B보다 많다.
- L. 용승은 C가 평년보다 강하다.
- ㄷ. 평균 해수면 높이는 A가 C보다 높다.

과학탐구 영역

17. 그림은 대서양의 수온과 염분 분포를, 표는 수괴 A, B, C의 평균 수온과 염분을 나타낸 것이다. A, B, C는 남극 저층수, 남극 중층수, 북대서양 심층수를 순서 없이 나타낸 것이다.



수괴	평균 수온(℃)	평균 염분(psu)
A	2.5	34.9
В	0.4	34.7
С	()	34.3

이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

----<보 기>-

- ¬. A는 북대서양 심층수이다.
- L. 평균 밀도는 A가 C보다 작다.
- 다. B는 주로 남쪽으로 이동한다.
- \bigcirc

18. 표는 별 (가)~(라)의 물리량을 나타낸 것이다.

별	표면 온도(K)	절대 등급	반지름 $(imes 10^6 { m km})$
(가)	6000	+3.8	1
(나)	12000	-1.2	9
(다)	()	-6.2	100
(라)	3000	()	4

- 이에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① ①은 25이다.
- ② (가)의 분광형은 M형에 해당한다.
- ③ 복사 에너지를 최대로 방출하는 파장은 (다)가 (가)보다 길다.
- ④ 단위 시간당 방출하는 복사 에너지양은 (나)가 (라)보다 많다.
- ⑤ (가)와 같은 별 10000개로 구성된 성단의 절대 등급은 (라)의 절대 등급과 같다.

19. 방사성 동위 원소 X, Y가 포함된 어느 화강암에서, 현재 X의 자원소 함량은 X 함량의 3배이고, Y의 자원소 함량은 Y 함량과 같다. 자원소는 모두 각각의 모원소가 붕괴하여 생성된다.


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

一<보 기>-

- □. 화강암의 절대 연령은 Y의 반감기와 같다.
- 고원소 함량
 모원소 함량

 모원소 함량 + 자원소 함량
 의
 감소량은 X가 Y의 2배이다.
- \Box . Y의 함량이 현재의 $\frac{1}{2}$ 이 될 때, X의 자원소 함량은 X 함량의 7배이다.
- ① ¬

- 2 \(\) 3 \(\), \(\) 4 \(\), \(\) 5 \(\), \(\), \(\)
- 20. 그림 (가)는 중심별과 행성이 공통 질량 중심에 대하여 공전하는 원 궤도를, (나)는 중심별의 시선 속도를 시간에 따라 나타낸 것이다. 행성이 A에 위치할 때 중심별의 시선 속도는 -60m/s이고, 행성의 공전 궤도면은 관측자의 시선 방향과 나란하다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 빛의 속도는 $3 \times 10^8 \,\mathrm{m/s}$ 이다.) [3점]

----<보 기>-

- \neg . 행성의 공전 방향은 A →B → C이다.
- L. 중심별의 스펙트럼에서 500nm의 기준 파장을 갖는 흡수선의 최대 파장 변화량은 0.001nm이다.
- □. 중심별의 시선 속도는 행성이 B를 지날 때가 C를 지날 때의 $\sqrt{2}$ 배이다.
- \bigcirc
- 2 L

- 3 7, 5 4 4, 5 7, 6, 5
- * 확인 사항
- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인 하시오.

2023학년도 대학수학능력시험 9월 모의평가 문제지

제 4 교시

과학탐구 영역(지구과학I)

수험 번호 성명

제[]선택

1. 다음은 뇌우, 우박, 황사에 대하여 학생 A, B, C가 나눈 대화를 나타낸 것이다.



제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은?

- ① A
- ② B

- ③ A. C ④ B. C ⑤ A. B. C
- 2. 그림은 상부 맨틀에서만 대류가 일어나는 모형을 나타낸 것이다.




이 모형에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

---<보 기>-

- ㄱ. 판을 이동시키는 힘의 원동력을 설명할 수 있다.
- ㄴ. 해양 지각의 평균 연령이 대륙 지각의 평균 연령보다 적은 이유를 설명할 수 있다.
- ㄷ. 뜨거운 플룸이 핵과 맨틀의 경계 부근에서 생성되어 상승 하는 것을 설명할 수 있다.
- ① ¬

- 2 L 3 L 4 7, L 5 7, L
- 3. 그림은 어느 중위도 해역에서 A 시기와 B 시기에 각각 측정한 깊이 0~50m의 해수 특성을 수온-염분도에 나타낸 것이다.
 - 이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]



---<보 기>-

- □. 수온만을 고려할 때, 해수면에서 산소 기체의 용해도는 A가 B보다 크다.
- ㄴ. 수온이 14℃인 해수의 밀도는 A가 B보다 작다.
- 다. 혼합층의 두께는 A가 B보다 두껍다.
- ① ¬ ② L ③ □
- 47, 5 5 4, 5

4. 다음은 어느 퇴적 구조가 형성되는 원리를 알아보기 위한 실험이다.

[실험 목표]

○ (□)의 형성 원리를 설명할 수 있다.

[실험 과정]

(가) 100mL의 물이 담긴 원통형 유리 접시에 입자 크기가 $\frac{1}{16}$ mm 이하인 점토 100 g을 고르게 붓는다.



지구과

학

- (나) 그림과 같이 백열전등 아래에 원통형 유리 접시를 놓고 전등 빛을 비춘다.
- (다) ①전등 빛을 충분히 비추었을 때 변화된 점토 표면의 모습을 관찰하여 그 결과를 스케치한다.

[실험 결과]





<위에서 본 모습>


<옆에서 본 모습>

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

―<보 기>-

- ㄱ. '건열'은 ⑦에 해당한다.
- ㄴ. 건조한 환경에 노출되어 퇴적물의 표면이 갈라진 모습은 Û에 해당한다.
- ㄷ. 이 퇴적 구조는 주로 역암층에서 관찰된다.

- 5. 그림 (가)와 (나)는 가시광선으로 관측한 어느 타원 은하와 불규칙 은하를 순서 없이 나타낸 것이다.







이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. (가)는 불규칙 은하이다.
- ㄴ. (나)를 구성하는 별들은 푸른 별이 붉은 별보다 많다.
- ㄷ. 은하를 구성하는 별들의 평균 나이는 (가)가 (나)보다 적다.
- \bigcirc

과학탐구 영역

6. 그림 (가)는 H-R도에 별 ¬, □, □을, (나)는 별의 분광형에 따른 흡수선의 상대적 세기를 나타낸 것이다.





이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

----<보 기>-

- ㄱ. 반지름은 つ이 Û보다 작다.
- L. 광도 계급은 C과 C이 같다.
- □. □에서는 H I 흡수선이 Ca II 흡수선보다 강하게 나타난다.


 \bigcirc

(2) L

37. 5 4 4 4 5 7 4 5

7. 그림은 현생 누대 동안 생물 과의 멸종 비율과 대멸종이 일어난 시기 A, B, C를 나타낸 것이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



----<보 기>-

- ㄱ. 생물 과의 멸종 비율은 A가 B보다 높다.
- L. A와 B 사이에 최초의 양서류가 출현하였다.
- 다. B와 C 사이에 히말라야 산맥이 형성되었다.


① ¬

(2) L

③ ⊏

47, 5 5 4, 5

8. 그림은 온대 저기압 중심이 북반구 어느 관측소의 북쪽을 통과 하는 36시간 동안 관측한 기상 요소를 나타낸 것이다. 이 기간 동안 온난 전선과 한랭 전선이 모두 이 관측소를 통과하였다.



이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

------<보 기>-----


- □. 기압이 가장 낮게 관측되었을 때 남풍 계열의 바람이 불었다.
- L. A일 때 관측소의 상공에는 온난 전선면이 나타난다.
- □. 관측소에서 B와 C 사이에는 주로 적운형 구름이 관측된다.


① ¬

② L

37, 54, 57, 6, 5

9. 그림 (가)는 마그마가 생성되는 지역 A, B, C를, (나)는 깊이에 따른 암석의 용융 곡선을 나타낸 것이다. (나)의 □은 A, B, C 중 하나의 지역에서 마그마가 생성되는 조건이다.





A, B, C에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

----<보 기>-

- □. A에서는 주로 물이 포함된 맨틀 물질이 용융되어 마그마가 생성된다.
- ㄴ. 생성되는 마그마의 SiO₂ 함량(%)은 B가 C보다 높다.
- 다. 이은 C에서 마그마가 생성되는 조건에 해당한다.


 \bigcirc


② L

③ ⊏

④ ¬. ∟ ⑤ ∟. ⊏

10. 그림 (가)는 현재 우주 구성 요소의 비율을, (나)는 은하에 의한 중력 렌즈 현상을 나타낸 것이다. A, B, C는 각각 암흑 물질, 암흑 에너지, 보통 물질 중 하나이다.





이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

―<보 기>-

- □. A는 암흑 에너지이다.
- ㄴ. 현재 이후 우주가 팽창하는 동안 B의 비율 은 감소한다.
- 다. (나)를 이용하여 B가 존재함을 추정할 수 있다.

① ¬


② L

③ ⊏

47, 6, 5, 6, 6

11. 그림은 대기에 의한 남북 방향으로의 연평균 에너지 수송량을 위도별로 나타낸 것이다.

것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



-----<보 기>---

- ㄱ. A에서는 대기 대순환의 간접 순환이 위치한다.
- L. B에서는 해들리 순환에 의해 에너지가 북쪽 방향으로 수송된다.
- 다. 캘리포니아 해류는 C의 해역에서 나타난다.

12. 그림은 질량이 태양 정도인 별이 진화하는 과정에서 주계열 단계가 끝난 이후 어느 시기에 나타나는 별의 내부 구조이다.

수소 핵융합 반응

이 시기의 별에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

---<보 기>--

- ㄱ. 중심핵의 온도는 주계열 단계일 때보다 높다.
- ㄴ. 표면에서 단위 면적당 단위 시간에 방출하는 에너지양은 주계열 단계일 때보다 많다.
- □. 수소 함량 비율(%)은 중심핵이 A 영역보다 높다.


 \bigcirc

② L

③ ⊏

47, 67, 6

13. 그림은 태풍의 영향을 받은 우리나라 어느 관측소에서 24시간 동안 관측한 시간에 따른 기압, 풍향, 풍속, 시간당 강수량을 순서 없이 나타낸 것이다. 이 기간 동안 태풍의 눈이 관측소를 통과 하였다.



이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

----<보 기>----

- \neg . 관측소에서 풍속이 가장 강하게 나타난 시각은 t_3 이다.
- ㄴ. 관측소에서 태풍의 눈이 통과하기 전에는 서풍 계열의 바람이 불었다.
- \Box . 관측소에서 공기의 연직 운동은 t_3 이 t_4 보다 활발하다.

 \bigcirc

(2) L

③ ⊏

47, 5 5 4, 5

14. 표는 별 ᄀ, ℂ, ℂ의 표면 온도, 광도, 반지름을 나타낸 것이다. ①, ①, ②은 각각 주계열성, 거성, 백색 왜성 중 하나이다.

별	표면 온도(태양=1)	광도(태양=1)	반지름(태양=1)
9	$\sqrt{10}$	()	0.01
(L)	()	100	2.5
E	0.75	81	()

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

----<보 기>---

- ㄱ. 복사 에너지를 최대로 방출하는 파장은 つ이 ∪보다 길다.
- ㄴ. (⑤의 절대 등급 ⑥의 절대 등급) 값은 10이다.
- □. 별의 질량은 □이 □보다 크다.


 \bigcirc


(2) L

③ ⊏

4) 7, 5 5 4, 5

15. 그림 (가)는 동태평양 적도 해역과 서태평양 적도 해역의 시간에 따른 해면 기압 편차를, (나)는 (가)의 A와 B 중 한 시기의 태평양 적도 해역의 깊이에 따른 수온 편차를 나타낸 것이다. A와 B는 각각 엘니뇨 시기와 라니냐 시기 중 하나이고, 편차는 (관측값-평년값) 이다.





이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

----<보 기>-


- ¬. (나)는 B에 측정한 것이다.
- ㄴ. 적도 부근에서 (서태평양 평균 표층 수온 편차-동태평양 평균 표층 수온 편차) 값은 A가 B보다 크다.
- C. 적도 부근에서 동태평양 평균 해면 기압 은 A가 B보다 크다.


 \bigcirc

② ⊏

37, 4 4 4, 5 7, 4, 5

16. 그림 (가)는 지구의 공전 궤도를, (나)는 지구 자전축 경사각의 변화를 나타낸 것이다. 지구 자전축 세차 운동의 방향은 지구 공전 방향과 반대이고 주기는 약 26000년이다.





이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 지구 자전축 세차 운동과 지구 자전축 경사각 이외의 요인은 변하지 않는다고 가정한다.) [3점]


一<보 기>―

- □. 약 6500년 전 지구가 A 부근에 있을 때 북반구는 겨울철 이다.
- ㄴ. 35°N에서 기온의 연교차는 약 6500년 전이 현재보다 작다.
- □. 35°S에서 여름철 평균 기온은 약 13000년 후가 현재보다

1 7

과학탐구 영역

17. 그림은 어느 지괴의 현재 위치와 시기별 고지자기극의 위치를 나타낸 것이다. 고지자기극은 고지자기 방향으로 추정한 지리상 북극이고, 지리상 북극은 변하지 않았다. 현재 지자기 북극은 지리상 북극과 일치한다.




이 지괴에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

---<보 기>-

- □. 지괴는 60Ma~40Ma가 40Ma~20Ma보다 빠르게 이동 하였다.
- ∟. 60 Ma에 생성된 암석에 기록된 고지자기 복각은 (+) 값이다.
- C. 10Ma부터 현재까지 지괴의 이동 방향은 북쪽이다.

① ¬ ② L 37, 5 4 4, 5 5 7, 6, 5

18. 그림 (가)는 중심별이 주계열성인 어느 외계 행성계의 생명 가능 지대와 행성의 공전 궤도를, (나)는 (가)의 행성이 식 현상을 일으킬 때 중심별의 상대적 밝기 변화를 시간에 따라 나타낸 것이다.



이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중심별의 시선 속도 변화는 행성과의 공통 질량 중심에 대한 공전에 의해서만 나타나고, 행성은 원 궤도를 따라 공전하며, 행성의 공전 궤도면은 관측자의 시선 방향과 나란하다.) [3점]


- □. 생명 가능 지대의 폭은 이 외계 행성계가 태양계보다 좁다.
- L. <u>행성의 반지름</u> 은 <u>1</u> 이다. 중심별의 반지름 은 <u>125</u> 이다.
- \Box . 중심별의 흡수선 파장은 t_2 가 t_1 보다 짧다.

① つ ② し


③ ⊏

④ ¬, ∟ ⑤ ¬, ⊏

19. 그림 (가)는 어느 지역의 지질 단면을, (나)는 시간에 따른 방사성 원소 X와 Y의 <u>자원소 함량</u>을 나타낸 것이다. 화성암 A와 B에는 X와 Y 중 서로 다른 한 종류만 포함하고, 현재 A와 B에 포함된 방사성 원소의 함량은 각각 처음 양의 50%와 25% 중



서로 다른 하나이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

─<보 기>·


- ㄱ. 반감기는 X가 Y의 $\frac{1}{2}$ 배이다.
- L. A에 포함되어 있는 방사성 원소는 Y이다.
- \Box . (가)에서 단층 f-f'은 중생대에 형성되었다.


① ¬

② ㄷ

(3) 7. L (4) L. L (5) 7. L. L

20. 그림 (가)는 어느 우주 모형에서 시간에 따른 우주의 상대적 크기를 나타낸 것이고, (나)는 120억 년 전 은하 P에서 방출된 파장 λ인 빛이 80억 년 전 은하 Q를 지나 현재의 관측자에게 도달하는 상황을 가정하여 나타낸 것이다. 우주 공간을 진행하는 빛의 파장은 우주의 크기에 비례하여 증가한다.





이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, P와 Q는 관측자의 시선과 동일한 방향에 위치한다.)

-----<보 기>--

- ㄱ. 120억 년 전에 우주는 가속 팽창하였다.
- ㄴ. P에서 방출된 파장 λ 인 빛이 Q에 도달할 때 파장은 2.5λ
- ㄷ. (나)에서 현재 관측자로부터 Q까지의 거리 □은 80억 광년

① ¬

② L ③ ロ

(4) 7. C (5) L. C

- * 확인 사항
- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인


2023학년도 대학수학능력시험 문제지


제 4 교시

과학탐구 영역(지구과학 I)

수험 번호 제[]선택 성명

1. 그림 (가)는 1850~2019년 동안 전 지구와 아시아의 기온 편차 (관측값-기준값)를, (나)는 (가)의 A 기간 동안 대기 중 CO, 농도를 나타낸 것이다. 기준값은 1850~1900년의 평균 기온이다.






이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

--<보 기>-

- □. (가) 기간 동안 기온의 평균 상승률은 아시아가 전 지구보다 크다. L. (나)에서 CO₂ 농도의 연교차는 하와이가 남극보다 크다.
- C. A 기간 동안 전 지구의 기온과 CO, 농도는 높아지는 경향이 있다.
- \bigcirc
- ② ⊏

- 37, 4 4 4, 5 7, 4, 5
- 2. 그림은 플룸 구조론을 나타낸 모식도이다. A와 B는 각각 차가운 플룸과 뜨거운 플룸 중 하나이고, ①은 화산섬이다.






---<보 기>-

- □. A는 섭입한 해양판에 의해 형성된다.
- L. B는 태평양에 여러 화산을 형성한다.
- □. □을 형성한 열점은 판과 같은 방향으로 움직인다.
- ① ¬
- ② ⊏

- 37, 4 4, 5 7, 4, 5
- 3. 그림 (가)와 (나)는 어느 은하를 각각 가시광선과 전파로 관측한 영상이며, ①은 제트 이다.





- 이 은하에 대한 설명으로


옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

- □. 나선팔을 가지고 있다.
- L. 대부분의 별은 분광형이 A0인 별보다 표면 온도가 낮다.
- ㄷ. ①은 암흑 물질이 분출되는 모습이다.

4. 다음은 퇴적암이 형성되는 과정의 일부를 알아보기 위한 실험이다.

〔실험 목표〕

- 퇴적암이 형성되는 과정 중 (□)을/를 설명할 수 있다. [실험 과정]
- (가) 입자 크기 2mm 정도인 퇴적물 250mL가 담긴 원통에 물 250 mL를 넣는다.
- (나) 물의 높이가 퇴적물의 높이와 같아질 때까지 물을 추출한 뒤, 추출된 물의 부피를 측정한다.
- (다) 그림과 같이 원형 판 1개를 원통에 넣어 퇴적물을 압축시킨다.
- (라) 물의 높이가 퇴적물의 높이와 같아질 때까지 물을 추출하고, 그 물의 부피를 측정한다.



지구과

학

- (마) 동일한 원형 판의 개수를 1개씩 증가 시키면서 (라)의 과정을 반복한다.
- (바) 원형 판의 개수와 추출된 물의 부피와의 관계를 정리한다.
- [실험 결과]
- 과정 (나)에서 추출된 물의 부피: 100 mL
- 과정 (다)~(마)에서 원형 판의 개수에 따른 추출된 물의 부피

원형 판 개수(개)	1	2	3	4	5
추출된 물의 부피(mL)	27.5	8.0	6.5	5.3	4.5

이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

----<보 기>

- ㄱ. '다짐 작용'은 句에 해당한다.
- ㄴ. 과정 (나)에서 원통 속에 남아 있는 물의 부피는 222.5mL이다.
- ㄷ. 원형 판의 개수가 증가할수록 단위 부피당 퇴적물 입자의 개수는 증가한다.
- \bigcirc
- ② L

- 37, 5 4 4, 5 57, 4, 5
- 5. 표는 주계열성 A와 B의 질량, 생명 가능 지대에 위치한 행성의 공전 궤도 반지름, 생명 가능 지대의 폭을 나타낸 것이다.


주계열성	질량 (태양=1)	행성의 공전 궤도 반지름 (AU)	생명 가능 지대의 폭 (AU)
A	5	(🗇)	(🗈)
В	0.5	(🗓)	(

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ¬. 광도는 A가 B보다 크다.
- L. ①은 D보다 크다.
- ㄷ. 이은 리보다 크다.

과학탐구 영역

6. 그림은 해양판이 섭입되는 모습을 나타낸 것이다. A, B, C는 각각 마그마가 생성되는 지역과 분출 되는 지역 중 하나이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?


- ㄱ. A에서는 주로 조립질 암석이 생성된다.
- L. B에서는 안산암질 마그마가 생성될 수 있다.
- C. C에서는 맨틀 물질의 용융으로 마그마가 생성된다.

 \bigcirc

(2) L

37, 54, 57, 6, 5

7. 그림 (가)는 어느 날 18시의 지상 일기도에 태풍의 이동 경로를 나타낸 것이고, (나)는 이 시기에 태풍에 의해 발생한 강수량 분포를 나타낸 것이다.



이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

----<보 기>-

- □. 풍속은 A 지점이 B 지점보다 크다.
- L. 공기의 연직 운동은 C 지점이 D 지점보다 활발하다.
- C. C 지점에서는 남풍 계열의 바람이 분다.


① ¬

② L

③ ⊏

④ ٦, ١ ⑤ ١, □

8. 그림은 어느 온대 저기압이 우리나라를 지나는 3시간($T_1 \rightarrow T_4$) 동안 전선 주변에서 발생한 번개의 분포를 1시간 간격으로 나타낸 것이다. 이 기간 동안 온난 전선과 한랭 전선 중 하나가 A 지역을 통과하였다.




이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]


----<보 기>-


- □. 이 기간 중 A의 상공에는 전선면이 나타났다.
- ㄴ. $T_2 \sim T_3$ 동안 A에서는 적운형 구름이 발달하였다.
- C. 전선이 통과하는 동안 A의 풍향은 시계 반대 방향으로 바뀌었다.

① ¬

9. 그림 (가)는 북대서양의 해역 A와 B의 위치를, (나)와 (다)는 A와 B에서 같은 시기에 측정한 물리량을 순서 없이 나타낸 것이다. □과 □은 각각 수온과 용존 산소량 중 하나이다.







이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

―<보 기>-


- ¬. (나)는 A에 해당한다.
- L. 표층에서 용존 산소량은 A가 B보다 작다.
- 다. 수온 약층은 A가 B보다 뚜렷하게 나타난다.

① ¬

② L

3 = 4 7, = 5 7, =

10. 그림 (가)는 40억 년 전부터 현재까지의 지질 시대를 구성하는 A, B, C의 지속 기간을 비율로 나타낸 것이고, (나)는 초대륙 로디니아의 모습을 나타낸 것이다. A, B, C는 각각 시생 누대, 원생 누대, 현생 누대 중 하나이다.





이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

----<보 기>-

- ¬. A는 원생 누대이다.
- ㄴ. (나)는 A에 나타난 대륙 분포이다.
- 다. 다세포 동물은 B에 출현했다.


① ¬


② L

③ ⊏

4) つ, し5) し, こ

11. 그림 (가)와 (나)는 우주의 나이가 각각 10만 년과 100만 년일 때에 빛이 우주 공간을 진행하는 모습을 순서 없이 나타낸 것이다. (가)





이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른


一<보 기>ー

- ㄱ. (가) 시기 우주의 나이는 10만 년이다.
- ㄴ. (나) 시기에 우주 배경 복사의 온도는 2.7K이다.
- ㄷ. 수소 원자핵에 대한 헬륨 원자핵의 함량비는 (가) 시기가 (나) 시기보다 크다.

① ¬

2 - 3 - 4 7, - 5 7, -


12. 그림 (가)와 (나)는 어느 해역의 수온과 염분 분포를 각각 나타낸 것이고, (다)는 수온-염분도이다. A, B, C는 수온과 염분이 서로 다른 해수이고, ③과 ⑥은 이 해역의 서로 다른 수괴이다.



이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

----<보 기>


- 기. B는 L)에 해당한다.
- L. A와 B의 수온에 의한 밀도 차는 A와 B의 염분에 의한 밀도 차보다 크다.
- 다. C의 수괴가 서쪽으로 이동하면, C의 수괴는 B의 수괴 아래쪽으로 이동한다.
- 37, 5 4 4, 5 5 7, 6, 5 ① ¬ ② L
- 13. 그림은 질량이 태양 정도인 어느 별이 원시별에서 주계열 단계 전까지 진화하는 동안의 반지름과 광도 변화를 나타낸 것이다. A, B, C는 이 원시별이 진화하는 동안의 서로 다른 시기이다.



이 원시별에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

----<보 기>-


- □. 평균 밀도는 C가 A보다 작다.
- L. 표면 온도는 A가 B보다 낮다.
- ㄷ. 중심부의 온도는 B가 C보다 높다.
- \bigcirc (2) L
- 37, 5 4 4, 5 5 7, 4, 5
- 14. 그림은 1월과 7월의 지표 부근의 평년 바람 분포 중 하나를 나타낸 것이다. A, B, C는 주요 표층 해류가 흐르는 해역이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

- ㄱ. 이 평년 바람 분포는 1월에 해당한다.
- L. A와 B의 표층 해류는 모두 고위도 방향으로 흐른다.
- 다. C에서는 대기 대순환에 의해 표층 해수가 수렴한다.

15. 그림은 어느 해양판의 고지자기 분포와 지점 A, B의 연령을 나타낸 것이다. 해양판의 이동 속도와 해저 퇴적물이 쌓이는 속도는 일정하고, 현재 해양판의 이동 방향은 남쪽과 북쪽 중 하나이다.



이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 해양판의 이동 속도는 대륙판보다 빠르다.) [3점]

- □. A와 B 사이에 해령이 위치한다.
- L. 해저 퇴적물의 두께는 A가 B보다 두껍다.
- C. 현재 A의 이동 방향은 남쪽이다.
- \bigcirc
- (2) L

- 37, 5 4 4, 5 7, 6, 5

16. 표는 태양과 별 (가), (나), (다)의 물리량을 나타낸 것이다. (가), (나), (다) 중 주계열성은 2개이고, (나)와 (다)의 겉보기 밝기는 같다.

별	복사 에너지를 최대로 방출하는 파장(μm)	절대 등급	반지름 (태양=1)	
태양	0.50	+4.8	1	
(フト)	(🗇)	-0.2	2.5	
(나)	0.10	()	4	
(다)	0.25	+9.8	()	


이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?


-----<보 기>----

- ㄱ. ①은 0.125이다.
- . 중심핵에서의 $\frac{p-p}{CNO}$ 반응에 의한 에너지 생성량 $\frac{e}{CNO}$ 순환 반응에 의한 에너지 생성량 (나)가 태양보다 작다.
- ㄷ. 지구로부터의 거리는 (나)가 (다)의 1000배이다.

과학탐구 영역

17. 그림 (가)는 태평양 적도 부근 해역에서 관측한 바람의 동서 방향 풍속 편차를, (나)는 이 해역에서 A와 B 중 어느 한 시기에 관측된 20℃ 등수온선의 깊이 편차를 나타낸 것이다. A와 B는 각각 엘니뇨와 라니냐 시기 중 하나이고, (+)는 서풍, (-)는 동풍에 해당 한다. 편차는 (관측값-평년값)이다.





이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

一<보 기>-

- ¬. (나)는 B에 해당한다.
- L. 동태평양 적도 부근 해역에서 해수면 높이는 B가 평년 보다 낮다.
- ㄷ. 적도 부근의 (동태평양 해면 기압-서태평양 해면 기압) 값은 A가 B보다 크다.
- \bigcirc
- (2) L
- ③ ⊏
- 47, 5 5 4, 5

18. 표 (가)는 외부 은하 A와 B의 스펙트럼 관측 결과를, (나)는 우주 구성 요소의 상대적 비율을 T_1 , T_2 시기에 따라 나타낸 것이다. T_1 , T_2 는 관측된 A, B의 빛이 각각 출발한 시기 중 하나이고, a, b, c는 각각 보통 물질, 암흑 물질, 암흑 에너지 중 하나이다.

은하	기준 파장	관측 파장
A	120	132
В	150	600
		(다의 · nm)

우주 구성 요소	T_1	T_2
a	62.7	3.4
b	31.4	81.3
С	5.9	15.3

(단위: %)

이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 빛의 속도는 $3 \times 10^5 \text{km/s}$ 이다.)


----<보 기>-

- ㄱ. 우리은하에서 관측한 A의 후퇴 속도는 3000km/s이다.
- L. B는 T_2 시기의 천체이다.
- 다. 우주를 가속 팽창시키는 요소는 b이다.
- \bigcirc
- (2) L
- ③ ⊏
- 4 7, L 5 L, C

19. 그림 (가)와 (나)는 어느 두 지역의 지질 단면을, (다)는 시간에 따른 방사성 원소 X와 Y의 붕괴 곡선을 나타낸 것이다. 화강암 A와 B에는 한 종류의 방사성 원소만 존재하고, X와 Y 중 서로 다른 한 종류만 포함한다. 현재 A와 B에 포함된 방사성 원소의 함량은 각각 처음 양의 25%, 12.5% 중 서로 다른 하나이다. 두 지역의 셰일에서는 삼엽충 화석이 산출된다.








이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

-<보 기>

- ㄱ. (가)에서는 관입이 나타난다.
- L. B에 포함되어 있는 방사성 원소는 X이다.
- 1이다.
- \bigcirc
- ②

- 37, 4 4 4, 5 7, 4, 5
- 20. 그림은 어느 외계 행성계에서 식 현상을 일으키는 행성에 의한 중심별의 상대적 밝기 변화를 일정한 시간 간격에 따라 나타낸 것이다. 중심별의 반지름에 대하여 행성 반지름은 $\frac{1}{20}$ 배, 행성의 중심과 중심별의 중심 사이의 거리는 4.2배이다. A는 식 현상이 끝난 직후이다.



이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 행성은 원 궤도를 따라 공전하며, t_1 , t_5 일 때 행성의 중심과 중심별의 중심은 관측자의 시선과 동일한 방향에 위치하고, 중심별의 시선 속도 변화는 행성과의 공통 질량 중심에 대한 공전에 의해서만 나타난다.) [3점]

—<보 기>—

- \neg . t_1 일 때, 중심별의 상대적 밝기는 원래 광도의 99.75%이다.
- ㄴ. $t_2 \rightarrow t_3$ 농안 중심별의 스펙트럼에서 흡수선의 파장은 점차 길어진다.
- ㄷ. 중심별의 시선 속도는 A일 때가 t_2 일 때의 $\frac{1}{4}$ 배이다.
- \bigcirc
- ② ⊏

- 37, 4 4 4, 5 7, 4, 5
- * 확인 사항
- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인