

제2 교시

수학 영역

5 지선 다형

1. $\sqrt[3]{54} \times 2^{\frac{5}{3}}$ 의 값은? [2점]

- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

$$2^{\frac{1}{3}} \times 3 \times 2^{\frac{5}{3}} = \boxed{12}$$

2. 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + x$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h) - f(3)}{2h}$ 의 값은? [2점]

- ① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

$$\frac{1}{2} f'(3) ?$$

$$f'(x) = 3x^2 - 6x + 1$$

$$f'(3) = 16$$

$$\frac{1}{2} f'(3) = \boxed{8}$$

3. $\cos \theta > 0$ 이고 $\sin \theta + \cos \theta \tan \theta = -1$ 일 때, $\tan \theta$ 의 값은? [3점]

- ① $-\sqrt{3}$ ② $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ④ 1 ⑤ $\sqrt{3}$

$$\sin \theta = -\frac{1}{2} \quad \begin{array}{c} 2 \\ \triangle \\ \sqrt{3} \end{array} \quad 1$$

$\cos \theta > 0, \sin \theta < 0 \Rightarrow$ 제4사분면

$$\tan \theta = \boxed{-\frac{\sqrt{3}}{3}}$$

4. 함수

$$f(x) = \begin{cases} 2x+a & (x < 3) \\ \sqrt{x+1}-a & (x \geq 3) \end{cases}$$

이 $x=3$ 에서 연속일 때, 상수 a 의 값은? [3점]

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

$$6+a = 2-a \quad a = \boxed{-2}$$

5. 다항함수 $f(x)$ 가

$$f'(x) = x(3x+2), \quad f(1) = 6$$

을 만족시킬 때, $f(0)$ 의 값은? [3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

$$f'(x) = 3x^2 + 2x$$

$$f(x) = x^3 + x^2 + C$$

$$f(1) = 2 + C = 6 \quad \therefore C = 4$$

$$\therefore f(x) = x^3 + x^2 + 4$$

$$f(0) = \boxed{4}$$

6. 공비가 1보다 큰 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

$$\frac{S_4}{S_2} = 5, \quad a_5 = 48$$

일 때, $a_1 + a_4$ 의 값은? [3점]

- ① 39 ② 36 ③ 33 ④ 30 ⑤ 27

$$\frac{a(r^4-1)}{r-1} = r^2+1=5 \quad \therefore r=2 (r>1)$$

$$ar^4 = 16a = 48 \quad \therefore a = 3$$

$$a_1 + a_4 = 3 + 24 = \boxed{27}$$


7. 함수 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 - 5x + 1$ 이 닫힌구간 $[a, b]$ 에서감소할 때, $b-a$ 의 최댓값은? (단, a, b 는 $a < b$ 인 실수이다.)

[3점]

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

$$f'(x) = x^2 - 4x - 5$$

$$= (x-5)(x+1)$$

 $[-1, 5]$ 에서 감소

$$b-a \text{ 최대} = 5 - (-1) = \boxed{6}$$

8. 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여

$$(x+1)f(x) + (1-x)g(x) = x^3 + 9x + 1, \quad f(0) = 4$$

일 때, $f'(0) + g'(0)$ 의 값은? [3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

$$x=0 \quad f(0) + g(0) = 1, \quad g(0) = -3$$

$$\text{미분} \quad f(x) + (x+1)f'(x) - g(x) + (1-x)g'(x) = 3x^2 + 9$$

$$x=0 \quad f(0) + f'(0) - g(0) + g'(0) = 9$$

$$\therefore f'(0) + g'(0) = \boxed{2}$$

9. 좌표평면 위의 두 점 $(0, 0), (\log_2 9, k)$ 를 지나는 직선이 직선 $(\log_4 3)x + (\log_8 8)y - 2 = 0$ 에 수직일 때, 3^k 의 값은? (단, k 는 상수이다.) [4점]

- ① 16 ② 32 ③ 64 ④ 128 ⑤ 256

$$\text{수직} = \left(\frac{1}{\log_4 3}\right) \times \left(\frac{1}{\log_8 8}\right) = -1$$

$$\frac{k}{\log_2 9} \times \frac{-\log_4 3}{\log_4 8} = -1$$

$$\therefore k = 6 \log_3 2$$

$$3^k = 2^6 = \boxed{64}$$

10. 시각 $t=0$ 일 때 동시에 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 $t(t \geq 0)$ 에서의 속도가 각각

$$v_1(t) = 3t^2 - 6t - 2, \quad v_2(t) = -2t + 6$$

이다. 출발한 시각부터 두 점 P, Q가 다시 만날 때까지 점 Q가 움직인 거리는? [4점]

- ① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11


$$x_1(t) = t^3 - 3t^2 - 2t$$

$$x_2(t) = -t^2 + 6t$$

$$x_1 = x_2, \quad t^3 - 2t^2 - 8t = 0$$

$$t(t+2)(t-4) = 0$$

$t=4$ 에서 다시 만남.



$$\therefore 9 + 1 = \boxed{10}$$

11. 공차가 음의 정수인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_6 = -2, \sum_{k=1}^8 |a_k| = \sum_{k=1}^8 a_k + 42$$

일 때, $\sum_{k=1}^8 a_k$ 의 값은? [4점]

- ① 40 ② 44 ③ 48 ④ 52 ⑤ 56

i) $a_5 > 0$

$$-2(a_6 + a_7 + a_8) = 42$$

$$-6a_7 = 42, a_7 = -7$$

$$\boxed{a = 23, d = -5}$$

ii) $a_5 < 0$

$$-2-d = a_5 \quad -2-d < 0$$

$$0 > d > -2 \quad (d \text{는 음의 정수})$$

$$\therefore d = -1$$

$$\sum_{k=1}^8 |a_k| \neq \sum_{k=1}^8 a_k + 42 \quad (\times)$$

$$\therefore a_n = -5n + 28$$

$$\sum_{k=1}^8 a_k = \frac{23 + (-12)}{2} \times 8 = \boxed{44}$$

12. 실수 a 에 대하여 함수 $f(x)$ 는

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2 + 3x + a & (x < 0) \\ 3x + a & (x \geq 0) \end{cases}$$

이다. 함수

$$g(x) = \int_{-4}^x f(t) dt$$


가 $x=2$ 에서 극값을 가질 때, 함수 $g(x)$ 의 극댓값은? [4점]

- ① 18 ② 20 ③ 22 ④ 24 ⑤ 26

$$g'(x) = f(x)$$

$$g'(2) = f(2) = 0 \quad 6 + a = 0, a = -6$$

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2 + 3x - 6 & (x < 0) \\ 3x - 6 & (x \geq 0) \end{cases}$$



$$\frac{7}{2} < 1 \Rightarrow x = -2$$

$$g(-2) = \int_{-4}^{-2} f(t) dt$$

$$= \left[x^3 + \frac{3}{2}x^2 - 6x \right]_{-4}^{-2}$$

$$= \boxed{26}$$


13 그림과 같이

$$2\overline{AB} = \overline{BC}, \cos(\angle ABC) = -\frac{5}{8}$$

인 삼각형 ABC의 외접원을 O라 하자. 원 O 위의 점 P에 대하여 삼각형 PAC의 넓이가 최대가 되도록 하는 점 P를 Q라 할 때, $\overline{QA} = 6\sqrt{10}$ 이다. 선분 AC 위의 점 D에 대하여

$\angle CDB = \frac{2}{3}\pi$ 일 때, 삼각형 CDB의 외접원의 반지름의 길이는?

[4점]



②

- ① $3\sqrt{3}$ ② $4\sqrt{3}$ ③ $3\sqrt{6}$ ④ $5\sqrt{3}$ ⑤ $4\sqrt{6}$

넓이 최대 = QAC가 이등변 삼각형.

$\angle QAC = \theta$ 라하면, $\angle ABC = \pi - \theta, \cos(\pi - \theta) = -\frac{5}{8}$

CA에 대해, $\triangle QAC, \triangle ABC$ 각각 코사인 법칙 적용하면

$$360 + 360 - 2 \times 360 \cos \theta = \overline{AB}^2 + 4\overline{AB}^2 - 4\overline{AB}^2 \cos(\pi - \theta)$$

$$2 \times 360 \times \frac{3}{8} = \frac{5}{2} \overline{AB}^2, \overline{AB} = 6$$

$\triangle CDB$ 에 사인 법칙을 적용하면,

$$\frac{12}{\sin \frac{2}{3}\pi} = 2R \quad [R = 4\sqrt{3}]$$


14 두 정수 a, b 에 대하여 함수 $f(x)$ 는

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 2ax + \frac{a^2}{4} + b^2 & (x \leq 0) \\ x^3 - 3x^2 + 5 & (x > 0) \end{cases}$$

이다. 실수 t 에 대하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=t$ 가 만나는 점의 개수를 $g(t)$ 라 하자. 함수 $g(t)$ 가 $t=k$ 에서 불연속인 실수 k 의 개수가 2가 되도록 하는 두 정수 a, b 의 모든 순서쌍 (a, b) 의 개수는? [4점]


- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

i) $a > 0$




$$\frac{a^2}{4} + b^2 = 1 \quad [(2, 0)]$$

ii) $a = 0$



$$b^2 = 1 \quad [(0, 1), (0, -1)]$$

iii) $a < 0$



$$\begin{cases} \frac{a^2}{4} + b^2 = 5 \\ -\frac{3}{4}a^2 + b^2 = 1 \end{cases}$$

$$a = -2, b = \pm 2$$

$$[(-2, 2), (-2, -2)]$$

$$\therefore [5]$$


15 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n & (a_n > n) \\ 3n - 2 - a_n & (a_n \leq n) \end{cases}$$

을 만족시킬 때, $a_5 = 5$ 가 되도록 하는 모든 a_1 의 값의 곱은?

[4점]

- ① 20 ② 30 ③ 40 ④ 50 ⑤ 60



단답형

16 방정식 $4^x = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-9}$ 을 만족시키는 실수 x 의 값을 구하시오.

[3점]

$$2^{2x} = 2^{-x+9}$$

$$x = 3$$

17. $\int_0^2 (3x^2 - 2x + 3) dx - \int_2^0 (2x + 1) dx$ 의 값을 구하시오. [3점]

$$\int_0^2 (3x^2 + 4) dx$$

$$= [x^3 + 4x]_0^2$$

$$= 16$$

18 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^{10} a_k + \sum_{k=1}^9 a_k = 137, \quad \sum_{k=1}^{10} a_k - \sum_{k=1}^9 2a_k = 101$$


일 때, a_{10} 의 값을 구하시오. [3점]

$$\begin{cases} S_{10} + S_9 = 137 \\ S_{10} - 2S_9 = 101 \end{cases} \quad S_9 = 12, S_{10} = 125$$

$$\therefore a_{10} = S_{10} - S_9 = \boxed{113}$$

19 실수 a 에 대하여 함수 $f(x) = x^3 - \frac{5}{2}x^2 + ax + 2$ 이다.

곡선 $y = f(x)$ 위의 두 점 $A(0, 2)$, $B(2, f(2))$ 에서의 접선을 각각 l , m 이라 하자. 두 직선 l , m 이 만나는 점이 x 축 위에 있을 때, $60 \times |f(2)|$ 의 값을 구하시오. [3점]



$$f'(x) = 3x^2 - 5x + a$$

$$l: ax + 2$$

$$m: (a+2)(x-2) + 2a$$

$$(a+2)x - 4 = ax + 2 \quad \therefore a = -\frac{2}{3}$$

$$60 \times |f(2)| = \boxed{80}$$

20 두 함수 $f(x) = 2x^2 + 2x - 1$, $g(x) = \cos \frac{\pi}{3}x$ 에 대하여

$0 \leq x < 12$ 에서 방정식

$$f(g(x)) = g(x)$$

를 만족시키는 모든 실수 x 의 값의 합을 구하시오. [4점]


$$g(x) = t$$

$$f(t) = t$$

$$2t^2 + 2t - 1 = t$$

$$2t^2 + t - 1 = 0 \quad (t+1)(2t-1) = 0$$

$$\frac{1}{2} \quad -1 \quad t = -1, \frac{1}{2}$$



$$x = 6을 대입으로 구간이 6개$$


$$= 6 \times 6 = 36$$

$$\boxed{36}$$

21. $a > 2$ 인 실수 a 에 대하여 기울기가 -1 인 직선이 두 곡선

$$y = a^x + 2, \quad y = \log_a x + 2$$

와 만나는 점을 각각 A, B라 하자. 선분 AB를 지름으로 하는 원의 중심의 y 좌표가 $\frac{19}{2}$ 이고 넓이가 $\frac{121}{2}\pi$ 일 때, a^2 의 값을 구하시오. [4점]



$$r = \frac{11}{\sqrt{2}} \Rightarrow AB = 11\sqrt{2}$$

$$A(t, a^{t+2})$$

$$B(t+11, a^{t-9})$$

$$\log_a(t+11)$$

$$A(t, a^{t+2})$$


$$a^{t+2} = 15 \quad a^t = 13$$

$$t = \frac{5}{2} - \frac{11}{2} = -3$$

$$\therefore a^2 = \boxed{13}$$

22. 함수 $f(x) = |x^3 - 3x + 8|$ 과 실수 t 에 대하여

단원구간 $[t, t+2]$ 에서의 $f(x)$ 의 최댓값을 $g(t)$ 라 하자. 서로 다른 두 실수 α, β 에 대하여 함수 $g(t)$ 는 $t = \alpha$ 와 $t = \beta$ 에서만 미분가능하지 않다. $\alpha\beta = m + n\sqrt{6}$ 일 때, $m+n$ 의 값을 구하시오. (단, m, n 은 정수이다.) [4점]



미분가능 = $g(t)$ 가 왼쪽값, 오른쪽값으로 변하지 않는 구간.

$$i) -(x^3 - 3x + 8) = 10$$

$$x^3 - 3x + 18 = 0$$

$$(x+3)(x^2 - 3x + 6) = 0 \quad \therefore x = -3 = \alpha$$

$$ii) x^3 - 3x + 8 = (x+2)^3 - 3(x+2) + 8$$

$$x^3 - 3x + 8 = x^3 + 6x^2 + 12x + 8 - 3x - 6 + 8$$

$$6x^2 + 12x + 2 = 0$$

$$3x^2 + 6x + 1 = 0$$

$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{6}}{3} \quad (x > 0) \therefore x = \frac{-3 + \sqrt{6}}{3} = \beta$$

$$\alpha\beta = 3 - \sqrt{6}$$

$$m+n = \boxed{2}$$

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(확률과 통계)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제2교시

수학 영역(확률과 통계)

5지선다형

23. ${}_3H_3$ 의 값은? [2점]

- ① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18

$${}_3H_3 = {}_5C_2$$

24. 숫자 1, 2, 3 중에서 중복을 허락하여 4개를 택해 일렬로 나열하여 만들 수 있는 네 자리 자연수 중 홀수의 개수는? [3점]


- ① 30 ② 36 ③ 42 ④ 48 ⑤ 54

$$\begin{array}{c} \text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \\ \text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \\ \text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \\ \text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \end{array}$$

$$3^3 \times 2$$

25. 남학생 5명, 여학생 2명이 있다. 이 7명의 학생이 일정한 간격을 두고 원 모양의 탁자에 모두 둘러앉을 때, 여학생끼리 이웃하여 앉는 경우의 수는?
(단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) [3점]


① 200 ② 240 ③ 280 ④ 320 ⑤ 360



$$5! \times 2$$

(남학생) (여학생 자리배열)


26. 그림과 같이 직사각형 모양으로 연결된 도로망이 있다. 이 도로망을 따라 A 지점에서 출발하여 B 지점까지 최단 거리로 갈 때, P 지점을 지나면서 Q 지점을 지나지 않는 경우의 수는? [3점]



① 72 ② 81 ③ 90 ④ 99 ⑤ 108

$$3 \times 3 \times 11 = 99$$

27. 그림과 같이 문자 A, A, A, B, B, C, D가 각각 하나씩 적혀 있는 7장의 카드와 1부터 7까지의 자연수가 각각 하나씩 적혀 있는 7개의 빈 상자가 있다.



각 상자에 한 장의 카드만 들어가도록 7장의 카드를 나누어 넣을 때, 문자 A가 적혀 있는 카드가 들어간 3개의 상자에 적힌 수의 합이 홀수가 되도록 나누어 넣는 경우의 수는? (단, 같은 문자가 적힌 카드끼리는 서로 구별하지 않는다.)

- ① 144 ② 168 ③ 192 ④ 216 ⑤ 240

i) 홀+홀+홀 $4C_3 \times \frac{4!}{2!} = 48$

ii) 홀+짝+짝 $3C_2 \times 4C_1 \times \frac{4!}{2!}$
 $= 144$

$\therefore 192$

28. 다음 조건을 만족시키는 자연수 a, b, c 의 모든 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는? [4점]

(가) $ab^2c = 720 = 2^4 \times 3^2 \times 5$

(나) a 와 c 는 서로소가 아니다.

- ① 38 ② 42 ③ 46 ④ 50 ⑤ 54

i) $b^2 = 1$ $ac = 2^4 \times 3^2 \times 5$

$2 \times (2H_4 \times H_2 - 4) = 22$

ii) $b^2 = 2^2$ $ac = 2^2 \times 3^2 \times 5$

$2 \times (2H_2 \times H_2 - 4) = 10$

iii) $b^2 = 3^2$ $2 \times (2H_4 - 2) = 6$

iv) $b^2 = 2^4$ (2)

v) $b^2 = 2^2 \times 3^2$ (2)

42

단답형

29. 세 명의 학생에게 서로 다른 종류의 초콜릿 3개와 같은 종류의 사탕 5개를 다음 규칙에 따라 남김없이 나눠주는 경우의 수를 구하시오.
(단, 사탕을 받지 못하는 학생이 있을 수 있다.) [4점]

- (가) 적어도 한 명의 학생은 초콜릿을 받지 못한다.
(나) 각 학생이 받는 초콜릿의 개수와 사탕의 개수의 합은 2 이상이다.

i) 초콜릿 0/1/2 배분

$$3 \times 3 \times 2 \times 2H_2 = 108$$

ii) 0/0/3 배분

$$3 \times 3 = 9$$

(117)

30. 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow X$ 의 개수를 구하시오. [4점]

- (가) $f(1) \leq f(2) \leq f(3)$
(나) $1 < f(5) < f(4)$
(다) $f(a) = b, f(b) = a$ 를 만족시키는 집합 X 의 서로 다른 두 원소 a, b 가 존재한다.

i) $f(2)=5, f(5)=2$

$$5 \times 3 = (15)$$

1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

ii) $f(3)=4, f(4)=3$

$$4H_2 = (10)$$

iii) $f(3)=5, f(5)=3$

$$5H_2 \times 2 = (30)$$

90

iv) $f(4)=5, f(5)=4$

$$5H_3 = (35)$$

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(미적분)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제2교시

수학 영역(미적분)

5지선다형

23. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n-1} + 3^{n-1}}{2^n - 3^n}$ 의 값은? [2점]

- ① $-\frac{1}{3}$ ② $-\frac{1}{6}$ ③ 0 ④ $\frac{1}{6}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

$\boxed{\frac{1}{3}}$

24. 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 이

$\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{n} = 3$

을 만족시킬 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 a_n + b_n}{1 + 2b_n}$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{5}{6}$ ⑤ 1

$a_n \approx \frac{1}{n}, b_n \approx 3n$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 a_n + b_n}{1 + 2b_n} = \frac{1+3}{\cancel{0}6} = \boxed{\frac{2}{3}}$

25 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$2n+3 < a_n < 2n+4$$

를 만족시킨 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(a_n+1)^2 + 6n^2}{na_n}$ 의 값은? [3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \approx 2n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2 + 2a_n + 1 + 6n^2}{na_n} = \frac{4+6}{2} = 5$$

26 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} - a_n = a_1 + 2$$

를 만족시킨다. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2a_n + n}{a_n - n + 1} = 3$ 일 때, a_{10} 의 값은?

(단, $a_1 > 0$) [3점]

- ① 35 ② 36 ③ 37 ④ 38 ⑤ 39

$$a_{n+1} - a_n = a_1 + 2 = d$$

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2(n-1)d + 2a_1 + n}{(n-1)d + a_1 - n + 1} = \frac{2d+1}{d-1} = 3 \therefore d = 4$$

$$a = 2$$

$$a_n = 4n - 2$$

$$a_{10} = 38$$

27. $a_1 = 3, a_2 = 6$ 인 등차수열 $\{a_n\}$ 과 모든 항이 양수인 수열 $\{b_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n a_k (b_k)^2 = n^3 - n + 3$$

을 만족시킬 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n b_{2n}}$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ ③ 3 ④ $3\sqrt{2}$ ⑤ 6

$$a_n = 3n$$

$$\sum_{k=1}^n a_k (b_k)^2 = S_n$$

$$S_n - S_{n-1} = 3n(b_n)^2 = n^3 - n + 3 - (n-1)^3 + (n-1) - 3$$

$$= 3n^2 - 3n = 3n(n-1)$$

$$3n(b_n)^2 = 3n(n-1)$$

$$(b_n)^2 = n-1$$

$$b_n = \sqrt{n-1}$$

$$b_{2n} = \sqrt{2n-1}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n b_{2n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n}{\sqrt{n-1} \sqrt{2n-1}}$$

$$= \frac{3}{\sqrt{2}} = \boxed{\frac{3\sqrt{2}}{2}}$$

28. 자연수 n 에 대하여 직선 $y = 2nx$ 가 곡선 $y = x^2 + n^2 - 1$ 과 만나는 두 점을 각각 A_n, B_n 이라 하자. 원 $(x-2)^2 + y^2 = 1$ 위의 점 P 에 대하여 삼각형 $A_n B_n P$ 의 넓이가 최대가 되도록 하는 점 P 를 P_n 이라 할 때, 삼각형 $A_n B_n P_n$ 의 넓이를 S_n 이라

하자. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n}$ 의 값은? [4점]


- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

$$2nx = x^2 + n^2 - 1$$

$$x^2 - 2nx + (n-1)(n+1) = 0$$

$$x = n-1, n+1$$

$$A_n(n-1, 2n^2-2n), B_n(n+1, 2n^2+2n)$$



밑변 $AB = \sqrt{16n^2 + 4}$

높이 최대값 = 원과 직선 사이의 거리 + 원의 반지름.

$$2nx - y = 0, (2, 0)$$

$$\frac{4n}{\sqrt{4n^2+1}} + \frac{1}{2} = \frac{S_n}{n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{1}{n} \times \frac{1}{2} \times \left(\frac{4n}{\sqrt{4n^2+1}} + \frac{1}{2} \right) \times \sqrt{16n^2+4} \right\}$$


$$= \boxed{6}$$

단답형

29. 자연수 n 에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = \frac{4}{n^3}x^3 + 1$$

이라 하자. 원점에서 곡선 $y=f(x)$ 에 그은 접선을 l_n , 접선 l_n 의 접점을 P_n 이라 하자. x 축과 직선 l_n 에 동시에 접하고 점 P_n 을 지나는 원 중 중심의 x 좌표가 양수인 것을 C_n 이라 하자. 원 C_n 의 반지름의 길이를 r_n 이라 할 때, $40 \times \lim_{n \rightarrow \infty} n^2(4r_n - 3)$ 의 값을 구하시오. [4점]



$$f'(x) = \frac{12}{n^3}x^2, P_n(t_n, \frac{4}{n^3}t_n^3 + 1) \text{이라 하면,}$$

$$l_n: y = \frac{12}{n^3}t_n^2(x - t_n) + \frac{4}{n^3}t_n^3 + 1$$

$$(0,0) \text{을 지나는 } t_n^3 = \frac{n^3}{8} \therefore t_n = \frac{n}{2}$$

$$P_n(\frac{n}{2}, \frac{3}{2})$$

$$\tan 2\alpha = |l_n \text{ 기울기}| = \frac{3}{n}$$

$\tan$ 반성각에 의해,

$$\tan(2\alpha) = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha} = \frac{3}{n}$$

$$3 \tan^2 \alpha + 2n \tan \alpha + 3 = 0$$

$$\tan \alpha = \frac{-n \pm \sqrt{n^2 - 9}}{3}$$

$$r_n = \overline{OP_n} \tan \alpha = \frac{1}{2} \sqrt{n^2 - 9} \times \frac{-n \pm \sqrt{n^2 - 9}}{3}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2(4r_n - 3) \Rightarrow \boxed{\frac{27}{4}}$$

$$\therefore \frac{27}{4} \times 40 = \boxed{270}$$

30. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 자연수 m 에 대하여 구간 $(0, \infty)$ 에서 정의된 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x) \left(\frac{x}{m}\right)^n + x}{\left(\frac{x}{m}\right)^n + 1}$$

라 하자. 함수 $g(x)$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $g(x)$ 는 구간 $(0, \infty)$ 에서 미분가능하고, $g'(m+1) \leq 0$ 이다.

(나) $g(k)g(k+1) = 0$ 을 만족시키는 자연수 k 의 개수는 3이다.

(다) $g(l) \geq g(l+1)$ 을 만족시키는 자연수 l 의 개수는 3이다.

$g(12)$ 의 값을 구하시오. [4점]

$$g(x) = \begin{cases} x & (-m < x < m) \\ \frac{f(x) + x}{2} & (x = m) \\ f(x) & (m < x) \end{cases}$$

$(0, \infty)$ 에서 미분 가능하므로

$$f(m) = m, f'(m) = 1$$

$$f(m+2) = f(m+3) = 0$$

(나)(다) 조건에 맞는 케이스.

$$f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$$

2개점을 12개까지

케이스에 맞는 경우를 찾아야함.

↓
연립방정식으로 풀면,

$$f(x) = (x-5)(x-8)(x-9)$$

$$g(12) = f(12) = 7 \times 4 \times 3 = \boxed{84}$$

* 확인 사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

○ 이어서, 「선택과목(이하)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.